



**التمرين الأول (3 نقط):**

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط  $A(0,1,4)$  و  $B(2,1,2)$

و  $C(2,5,0)$  و  $\Omega(3,4,4)$

1 (أ) بين أن  $\overline{AB} \wedge \overline{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$  0.25

ب) استنتج مساحة المثلث  $ABC$  والمسافة  $d(B, (AC))$  0.5

2) لتكن  $D$  منتصف القطعة  $[AC]$

أ) تحقق أن  $\overline{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overline{AB} \wedge \overline{AC})$  0.25

ب) استنتج أن  $d(\Omega, (ABC)) = 3$  0.5

3) لتكن  $(S)$  الفلكة ذات المعادلة  $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

أ) حدد مركز وشعاع الفلكة  $(S)$  0.5

ب) بين أن المستوى  $(ABC)$  مماس للفلكة  $(S)$  في نقطة ينبغي تحديدها 0.5

4) ليكن  $(Q_1)$  و  $(Q_2)$  المستويين الموازيين لـ  $(ABC)$  بحيث يقطع كل واحد منهما  $(S)$  وفق دائرة شعاعها  $\sqrt{5}$  0.5

حدد معادلة ديكارتية لكل من المستويين  $(Q_1)$  و  $(Q_2)$

**التمرين الثاني (3 نقط):**

في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$

التي أحاقها على التوالي  $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$  و  $b = 1 + \sqrt{2} + i$  و  $c = \bar{b}$  و  $d = 2i$

1) أكتب العدد العقدي  $a$  على الشكل المثلي 0.25

2) أ) تحقق أن  $b - d = c$  0.25

ب) بين أن  $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$  واستنتج أن النقط  $A$  و  $B$  و  $D$  مستقيمة 0.5

3) أ) تحقق أن  $ac = 2b$  0.25

ب) استنتج أن  $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$  0.5

4) نعتبر الدوران  $R$  الذي مركزه  $O$  وزاويته  $\frac{\pi}{4}$ ، والذي يحول كل نقطة  $M$  ذات اللق  $z$ ، من المستوى إلى

النقطة  $M'$  ذات اللق  $z'$

أ) بين أن  $z' = \frac{1}{2}az$  0.25

ب) استنتج أن  $R(C) = B$  وأن  $R(A) = D$  0.5

ج) بين أن  $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$  ثم استنتج قياسا للزاوية  $(\overline{AC}, \overline{AB})$  0.5

**التمرين الثالث (3 نقط):**

يحتوي صندوق  $U_1$  على ست كرات تحمل الأعداد: 0، 0، 1، 1، 1، 2  
ويحتوي صندوق  $U_2$  على خمس كرات تحمل الأعداد: 1، 1، 1، 2، 2.  
نفترض أنه لا يمكن التمييز بين كرات الصندوقين باللمس.

نعتبر التجربة العشوائية التالية: نسحب كرة من الصندوق  $U_1$ ، نسجل العدد  $a$  الذي تحمله، ثم نضعها في الصندوق  $U_2$  وبعد ذلك نسحب كرة من الصندوق  $U_2$  ونسجل العدد  $b$  الذي تحمله.

نعتبر الحدثين:  $A$  " الكرة المسحوبة من  $U_1$  تحمل العدد 1 "

$B$  " الجداء  $ab$  يساوي 2 "

1) أ) أحسب  $p(A)$ ، احتمال الحدث  $A$  0.5

ب) بين أن  $p(B) = \frac{1}{4}$  (يمكن استعمال شجرة الإمكانيات) 0.5

2) أ) أحسب  $p(A/B)$ ، احتمال الحدث  $A$  علما أن الحدث  $B$  محقق. 0.75

3) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يربط كل نتيجة للتجربة بالجداء  $ab$

أ) بين أن  $p(X = 0) = \frac{1}{3}$  0.25

ب) اعط قانون احتمال  $X$  (لاحظ أن القيم التي يأخذها  $X$  هي: 0 و 1 و 2 و 4) 0.5

ج) نعتبر الحدثين:  $M$  " الجداء  $ab$  زوجي غير منعدم " و  $N$  " الجداء  $ab$  يساوي 1 " 0.5

بين أن الحدثين  $M$  و  $N$  متساويا الاحتمال.

**المسألة (11 نقط):**

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]0, +\infty[$  بما يلي:  $f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$

ليكن  $(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (الوحدة: 1cm)

1) أ) تحقق أن لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$ :  $f(x) = \frac{3x - 2 - 2x \ln x + x(\ln x)^2}{x}$  0.25

ب) بين أن  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^2 = 0$  وأن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$  (يمكن وضع  $t = \sqrt{x}$ ) 0.5

ج) استنتج أن  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة. 0.5

د) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل فرعاً شلجيمياً، اتجاهه محور الأفاصيل بجوار  $+\infty$  0.75

2) بين أن  $f'(x) = \frac{2(1-x+x \ln x)}{x^2}$  لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$  0.5

(3) باستثمار جدول التغيرات أسفله للدالة المشتقة  $f'$  للدالة  $f$  على المجال  $]0, +\infty[$ :

(نعطي  $\beta \approx 4,9$ )


$x$	0	1	$\beta$	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$		$f'(\beta)$	0

- (أ) أثبت أن الدالة  $f$  تزايدية قطعاً على المجال  $]0, +\infty[$  ثم ضع جدول تغيرات  $f$ . 0.5  
 (ب) أنشئ جدول إشارة الدالة المشتقة الثانية  $f''$  للدالة  $f$  على المجال  $]0, +\infty[$  0.5  
 (ج) استنتج تقعر المنحنى  $(C_f)$  محدداً أفصولي نقطتي انعطافه. 1

(4) المنحنى  $(C_g)$  جانبه، تمثيل مبياني للدالة

$g : x \mapsto f(x) - x$  والتي تنعدم في  $\alpha$  و 1  
 $(\alpha \approx 0,3)$

ليكن  $(\Delta)$  المستقيم ذو المعادلة  $y = x$



- (أ) انطلاقاً من المنحنى  $(C_g)$ ، حدد إشارة الدالة  $g$  على  $]0, +\infty[$  0.5  
 (ب) استنتج أن المستقيم  $(\Delta)$  يوجد تحت  $(C_f)$  على المجال  $[\alpha, 1]$  وفوق  $(C_f)$  على كل من  $]0, \alpha[$  و  $]1, +\infty[$  0.5

(5) أنشئ المنحنى  $(C_f)$  والمستقيم  $(\Delta)$  في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (نأخذ  $\alpha \approx 0,3$  و  $\beta \approx 4,9$  و  $f(\beta) \approx 1,9$ ) 1.5

(6) أ) تحقق أن الدالة  $x \mapsto 2x - x \ln x$  دالة أصلية للدالة  $x \mapsto 1 - \ln x$  على  $[\alpha, 1]$  0.5

(ب) باستعمال مكاملة بالأجزاء، بين أن  $\int_{\alpha}^1 (1 - \ln x)^2 dx = 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$  1

(ج) استنتج بدلالة  $\alpha$  مساحة حيز المستوى المحصور بين منحنى الدالة  $f$  ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتيهما:  $x = 1$  و  $x = \alpha$  0.75

(7) لتكن  $(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة بـ  $u_0 \in ]\alpha, 1[$  والعلاقة  $u_{n+1} = f(u_n)$  لكل  $n$  من  $\square$  7

(أ) بين بالترجع أن  $\alpha < u_n < 1$  لكل  $n$  من  $\square$  0.5

(ب) بين أن المتتالية  $(u_n)$  تزايدية. (يمكن استعمال السؤال (4) ب) 0.5

(ج) استنتج أن المتتالية  $(u_n)$  متقاربة واحسب نهايتها. 0.75



عناصر الإجابة	التنقيط	السؤال	المسألة
	0.25	(1 أ)	
0.25 لحساب كل نهاية	0.5	(ب)	
0.25 لحساب النهاية و 0.25 للتأويل الهندسي	0.5	(ج)	
0.25 لحساب النهاية و 0.5 للفرع الشلجي	0.75	(د)	
0.25 لصيغ الاشتقاق و 0.25 للحساب	0.5	(2)	
$2 \times 0.25$	0.5	(3 أ)	
0.25 للإشارات و 0.25 لـ $f''(1) = f''(\beta) = 0$	0.5	(ب)	
0.5 لتقعر المنحنى و 0.25 لكل نقطة انعطاف	1	(ج)	
	0.5	(4 أ)	
0.25 لكل وضع نسبي	0.5	(ب)	
أنظر المبيان أسفله: 0.25 لإنشاء $(\Delta)$ و 0.25 للمماس في 1 و 0.25 للفرع الشلجي و 0.25 للمقارب العمودي و 0.25 لتقاطع المنحنى مع $(\Delta)$ و 0.25 لتغيير التقعر عند النقطة التي أفصولها $\beta$	1.5	(5)	
0.25 لاستحضار تعريف الدالة الأصلية و 0.25 للنتيجة	0.5	(6 أ)	
0.5 لتقنية المكاملة بالأجزاء و 0.5 للحساب	1	(ب)	
0.25 لصيغة المساحة و 0.25 لحساب $\int_{\alpha}^1 \left(2 - \frac{2}{x}\right) dx$	0.75	(ج)	
و 0.25 لتتمة الحساب			
0.25 لمبدأ الترجع و 0.25 لبقية الحساب	0.5	(7 أ)	
	0.5	(ب)	
0.25 للمعطيات الضرورية للمتتالية (اتصال الدالة، استقرار المجال) و 0.25 لتعليل التقارب و 0.25 لحساب النهاية .	0.75	(ج)	

