

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2015
-الموضوع -

٤٥٤٠٤ | ٢٠١٤ | ٩٠٦٠ | ٨٠٤٣ | ٣٣٨٧ | ٨



المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية
 والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

NS 35

3 مدة الإنجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

5 المعامل

شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية

الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

I (1,5)

- عرف ما يلي: مكملات غذائية - تعديل وراثي - تهجين.

II (1,5) - يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل مُعطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 3. أنقل على ورقة تحريرك الأزواج الآتية (1,...,....) ؛ (2,...,....) ؛ (3,...,....) ، ثم أكتب داخل كل زوج الحرف المقابل لاقتراح الصحيح.

1 - تعتمد تقنية المقاومة البيولوجية على:

أ . رش الحقول بمبيدات الأعشاب.

ب. رش الحقول بمبيدات الحشرات.

ج. إدخال كائنات حية مفترسة للطفيليات في الحقول.

د . تزاوج سلالتين نباتيتين مختلفتين للحصول على سلالة مقاومة للطفيليات.

2 - يعتمد استعمال الري السطحي التقليدي على:

أ. توصيل كميات ملائمة من المياه إلى جذور النبات وتنبلي جزء من التربة.

ب. جلب الماء إلى المحاصيل الزراعية باستعمال الأذرع المحورية.

ج. جريان طبقة رقيقة من الماء على مستوى الحقل باستعمال الرشاشات.

د. جلب الماء إلى المحاصيل الزراعية عن طريق شبكة من القنوات السطحية.

3 - يمكن تقدير المردودية باستعمال معامل الاستهلاك الذي:

أ . يعكس تحويل مواد غذائية يستهلكها الحيوان إلى مواد قابلة للاستهلاك من طرف الإنسان.

ب. يعكس تحويل مواد غذائية يستهلكها الحيوان إلى مواد قابلة وغير قابلة للاستهلاك من طرف الإنسان.

ج. يعكس تحويل مواد غذائية يستهلكها الحيوان إلى مواد غير قابلة للاستهلاك من طرف الإنسان.

د. يكون كبيرا كلما كان الإنتاج كبيرا.

III (1)

- أنقل على ورقة تحريرك رقم كل اقتراح رقم كل اقتراح من الاقتراحات الآتية، ثم أكتب أمامه "صحيح" أو "خطأ".

1- تمكن الزراعة المغطاة الرفع من المردود الزراعي بالتحكم في درجة الحرارة وفي شدة الإضاءة وفي قوام التربة

2- يؤدي تناوب الزراعات في نفس القطعة المزروعة إلى الحفاظ على خصوبة التربة والزيادة في مردود المحاصيل الزراعية

3- تتميز سلالة الدمان بقدرة تكاثرية مرتفعة.

4- يتم الحفاظ على سلالة نقية بتزاوج ذكور وإناث من سلالتين مختلفتين بعد الانتقاء.

IV (1)

- أنساب لكل عنصر التعريف المناسب له، وذلك باتمام الجدول الآتي بعد نقله على ورقة تحريرك.

العنصر	الحرف المقابل للتعريف
1- تسميد كيميائي	4 - حرث
الحرف المقابل للتعريف

أ. قلب التربة وخلط مكوناتها المعدنية والعضوية.

ب. مادة موجهة للقضاء على الطفيليات الحيوانية أو النباتية.

ج. إمداد التربة بالعناصر المعدنية الأساسية(الأزوت، والفسفور، والبوتاسيوم)

د. بقايا صấtة تنتهي بـ..... تربة استعمل كأعلاف للحيوانات.


المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبصري: (15 نقطة)

التمرين الأول: (5 نقاط)

في إطار دراسة بعض مظاهر الخبر الوراثي، تم إنجاز سلسلة من التجارب على أسيتابولاريا وهو طحلب وحيد الخلية يتراوح طوله بين 1 cm و 8 cm. يتشكل هذا الطحلب من قبعة وساقي ووبر جذري (قاعدة) يحتوي على النواة.

• السلسلة التجريبية الأولى:

تبين الوثيقة 1 رسوما تخطيطية لتجارب ونتائج التطعيم المتبادل للنواة بين نوعين من الأسيتابولاريا نوع ذو قبعة مستديرة (*Acétabularia mediteranea : Am*) . مع نوع ذو قبعة مسننة (*Acétabularia crénulata : Ac*) .




الوثيقة 1

1 - صرف النتائج التجريبية المحصلة. ماذا تستنتج؟ (1 ن)


• السلسلة التجريبية الثانية:

لتعرف العلاقة بين النواة وتركيب البروتينات المتدخلة في تشكيل القبعة، قام باحثون بإنجاز التجارب الآتية:

- تم زرع طحلب أسيتابولاريا فتي في وسط يحتوي على بشائر مشعة تدخل في تركيب ARNm ثم تمت إعادة زرره في وسط عادي تقدم الوثيقة 2 رسوما تخطيطية للظروف التجريبية لنتائج المحصلة
- تم عزل مستخلص خلوي يحتوي على المكونات السيتوبلازمية الضرورية لتركيب البروتينات خال من المادة الوراثية، وتم وضع هذا المستخلص داخل أنبوب اختبار في وسط غني بالأحماض الأمينية. في الزمن $t = 30 \text{ min}$ تمت إضافة ARNm. تبين الوثيقة 3 تغير كمية البروتينات المركبة وكمية ARNm في هذا الوسط.



الوثيقة 3



الوثيقة 2

إشعاع

2- أ. ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها من معطيات الوثيقة 2 ؟ (0.5 ن)

ب. بتوظيفك لـ 3، استنتاج دور ARNm ؟ (0.75 ن)

• السلسلة التجريبية الثالثة:

لإبراز كيفية تدخل النواة في تركيب القبعة تم إنجاز مجموعة من التجارب. تلخص الوثيقة 4 الظروف التجريبية والنتائج المحصلة.

التجارب	ظروف التجربة	النتيجة بعد شهرين	الوثيقة 4
1 : تجربة شاهد	قطع طحلب فتي على مستوى القطعة S وفصله إلى جزئين: القاعدة والساق. 	- الجزء الذي يتكون من القاعدة يركب الساق والقبعة. - الجزء الذي يتكون من الساق لا يركب القبعة جزئياً ويموت.	
2	قطع طحلب فتي آخر على مستوى القطعة S وفصله إلى جزئين: القاعدة والساق ومعالجة الساق بأنزيم الريبيونيكلياز Ribonuclease الذي يدمّر ARN.	- الجزء الذي يتكون من القاعدة يركب الساق والقبعة. - الجزء الذي يتكون من الساق لا يركب القبعة ويموت.	
3	معالجة طحلب فتي ثالث بمادة أكتينوميسين Actinomycine التي ترتبط بـ ADN وتحبّس نسخة ARN. بعد ذلك تم قطع الطحلب على مستوى S وفصله إلى جزئين: القاعدة والساق.	- الجزء الذي يتكون من القاعدة لا يركب الساق والقبعة.	

3- باستثمار نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة 4، بين كيف تتدخل النواة في تركيب القبعة. (1ن)

تتوفر النباتات الخضراء على أنزيم Rubisco ، وهو بروتين يتدخل في تركيب المادة العضوية. تحكم في تركيب هذا البروتين المورثة rbcl . تمثل الوثيقة 5 جزءاً من متالية الروكليوتيدات للخيط المستنسخ المتحكم في تركيب أنزيم Rubisco عند صنفين من النباتات: صنف عادي ينمو بشكل عادي وصنف طافر يتميز بنمو ضعيف.

رقم الثلاثية	63	64	65	66	67	68	69	70	رقم الثلاثية	63	64	65	66	67	68	69	70																
... TGT CCA TGT ACC TGA TGT CAT ACC ...		جزء من الخليط المستنسخ																															
... TGT CCA TGT ATC TGA TGT CAT ACC ...		جزء من الخليط المستنسخ																															
منحي القراءة																																	
الوثيقة 5																																	

تمثل الوثيقة 6 مقتطفاً من جدول الرمز الوراثي.


الأحماض الأمينية	برولين Pro	أرجينين Arg	فالين Val	تربيتوfan Trp	إيزولوسين Ille	أللين Ala	بدون معنى	تريونين Thr	غليسين Gly
الوحدات الرمزية	CCU CCA	CGU AGA	GUG GUA	UGG	AUA	GCC	UAA UAG	ACA ACU	GGG GGU
الوثيقة 6									

4- باستغلال معطيات الوثيقة 5 ومقتطف جدول الرمز الوراثي من الوثيقة 6، أبرز العلاقة مورثة -بروتين-صفة. (4,75,1n)

التمرين الثاني: (5 نقط)

ذبابة الخل حشرة صغيرة تعيش على الخضر والفواكه الفاسدة لدراسة بعض مظاهر انتقال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي عند هذه الحشرة نقترح المعطيات الآتية:

- تشكل الأمشاج عند ذباب الخل انطلاقا من الخلايا الأم للأمشاج (المنسليات) التي تتعرض للانقسام الاختزالي. تمثل الوثيقة 1 رسوما تخطيطية لمظهر الصبغيات في خلية منسلية ذكرية (الشكل - أ) وفي خلية منسلية أنثوية (الشكل - ب).



1- قارن مظهر الصبغيات وعددها بين خلايا ذكر وأنثى ذباب الخل، ثم أكتب الصيغة الصبغية للأمشاج المُنَجَّة بعد الانقسام الاختزالي. (1ن)

2- ممثل برسم تخططي مبسط الطور الانفصالي الأول من الانقسام الاختزالي لخلية تتحدر من منسلية أنثوية (دون تمثيل ظاهرة العبور). (1ن)

● لتفسير كيفية انتقال صفة لون العيون عند ذباب الخل نقترح التزاوجات الآتية:
التزاوج الأول: بين سلالتين نقيمهن من ذباب الخل، ذكور بعيون حمراء مع إناث بعيون بيضاء. تم الحصول في الجيل الأول F_1 على ذكور بعيون بيضاء وإناث بعيون حمراء.


3- ماذا تستنتج من تحليل نتيجة هذا التزاوج؟ (1.25ن)
استعمل R و r لتمثيل حللي مورثة لون العيون.

التزاوج الثاني: بين ذكور وإناث الجيل F_1 . تم الحصول على جيل F_2 . يعطي جدول الوثيقة 2 نتائج هذا التزاوج.

عدد الأفراد ذوي عيون بيضاء	عدد الأفراد ذوي عيون حمراء	الجنس	الجيل
119	118	الذكور	F_2
123	115	الإناث	

4- أعط التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني مستعينا بشبكة التزاوج. (1ن)

● يحدث التزاوج عند ذباب الخل بين الأنثى والذكر حيث يضع الذكر أمشاجه في المسالك التناسلية الأنوثية فيتم الإخصاب. تضع الأنثى البيض فوق الأغذية الفاسدة وبعد يوم واحد تفقس البيضة وتعطي يرقة تتحول إلى خادرة بعد 5 إلى 6 أيام. تتحول الخادرة بدورها خلال 4 أيام إلى حشرة بالغة. تلخص الوثيقة 3 دورة نمو هذه الحشرة.





5- أنجز الدورة الصبغية لذباب الخل وحدّد نمطها مع التعليل. (0.75 ن)

التمرين الثالث: (5 نقط)

تعرف العديد من الأوساط المائية (بحيرات، أنهار، ضيادات) حدوث ظاهرة التخاصب. تسبب هذه الظاهرة تدهور الحميات البيئية المائية. للكشف عن تطور الأوساط المائية بعد تعرضها لهذه الظاهرة، نقترح دراسة واستثمار المعطيات الآتية:

- تمثل الوثيقان 1 و 2 نتائج دراسة لجزت في بحيرة بأمريكا(Lac Washington)، تتوارد بالقرب من منطقة حضرية تعرف نموا ديموغرافيا سريعا كانت هذه البحيرة تستقبل المياه العادمة للمنطقة الحضرية المجاورة دون آلية معالجة إلى حدود سنة 1965.



- 1- بتوظيف معطيات الوثيقتين 1 و 2، فسر أثر طرح المياه العادمة على مياه البحيرة قبل سنة 1965. (1 ن)

- قبل سنوات الخمسينات من القرن الماضي كانت مياه بحيرة Annecy بفرنسا مياهاً نقية تعيش بها العديد من الحيوانات المائية. وقد عرفت هذه البحيرة بعد ذلك تدفق مياه عادمة ملوثة غنية بالفوسفور. أدى هذا إلى ارتفاع حمولة مياه البحيرة من المواد العضوية وتکاثر مفرط للطحالب.


تمثل الوثيقة 3 تطور كمية السمك المصطاد في بحيرة Annecy بين سنوات 1948 و 1970.

خلال هذه الفترة أنجزت عدة قياسات في المياه العميقة لبحيرة Annecy؛ تعطي الوثيقة 4 تطور تركيز ثنائي الأوكسجين المذاب في مياه هذه البحيرة.

تركيز O_2 المذاب بـ mg/L	السنوات
0,56	1937
0,36	1956
0,10	1966

تتكاثر الطحالب الزرقاء وتنشر بسرعة في المياه الملوثة الغنية بالأملاح المعدنية (الفوسفور والأزوت والبوتاسيوم)؛ يؤدي ذلك إلى ارتفاع حمولة المياه من المواد العضوية وتتكاثر بكتيريات مؤكسدة وبالتالي انخفاض كمية O_2 المذاب في الوسط.


الوثيقة 4



2- صرف تطور كمية السمك المصطاد (الوثيقة 3) وفسن التغيرات الملاحظة بعد سنة 1956 مستغلًا معلومات الوثيقة 4. (1.5 ن)

- تعالت عدة أصوات لإنقاذ بحيرة Annecy، وفي سنة 1964 تم تجميع المياه العادمة التي تصب في البحيرة بواسطة شبكة تصريف وإنشاء محطة للمعالجة.

تعطي الوثيقة 5 مراحل معالجة مياه عادمة في محطة معالجة معينة.



الوثيقة 5

3- صرف مراحل معالجة المياه العادمة في هذه المحطة (الوثيقة 5). (1 ن)

بعد إحداث محطة المعالجة بالمنطقة، لوحظ ارتفاع في كمية ثاني الأوكسجين المذاب في مياه البحيرة وتحسن شفافية الماء، كما ارتفعت كمية السمك المصطاد. تمثل الوثائقان 6 و 7 نتائج قياسات تم إنجازها في مياه بحيرة Annecy بعد إحداث محطة المعالجة

المنشطات	الطلالب الزرقاء	السنوات
12,21 %	86,30 %	1961
65,36 %	32,73 %	1967
95,55 %	0,22 %	1974

الوثيقة 7

السنوات	تركيز الفوسفور $\mu\text{g}/\text{L}$
1971	18,5
1972	14,5
1975	11,9
1976	11

الوثيقة 6

4- أ- استخرج من الوثائقين 6 ، 7 أهم التغيرات الملاحظة بعد إنشاء محطة المعالجة. (1 ن)

ب- أبرز تأثير انتشار الطحالب على جودة مياه بحيرة Annecy. (0.5 ن)

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2015
- عناصر الإجابة -



NR 35

3 مدة الإنجاز
5 المعامل

علوم الحياة والأرض

شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية


المادة


الشعبة أو المسلك

المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

رقم السؤال	الرقطة	تعاريف: $(3 \times 0,5 \text{ ن})$												
I	0,5 ن	- مكملات غذائية: مواد كيميائية يتم إضافتها للأعلاف أو يتم حقنها بهدف تحسين الإنتاج الحيواني - تعديل وراثي: نقبية يتم خلالها نقل مورثة (أو مورثات) مفيدة من كائن حي إلى آخر قصد إكسابه صفة وراثية جديدة..... - تهجين: نقبية تعتمد على تزاوج سلالات (أصناف) تتميز بصفة (أو صفات) مرغوبة من أجل الحصول على سلالات (أصناف) جديدة.....												
II	1,5 ن	(1 ، ج) - (2 ، د) - (3 ، أ) $(0,5 \times 3)$												
III	1 ن	(1 ، خطأ) - (2 ، صحيح) - (3 ، صحيح) - (4 ، خطأ) $(0,25 \times 4)$												
IV	1 ن	التعريف المناسب لكل عنصر: <table border="1"> <tr> <td>التعريف</td> <td>1- مبيد كيميائي</td> <td>2- كسب</td> <td>3- حرث</td> <td>4- تسميد كيميائي</td> <td>الحرف المقابل للتعريف</td> </tr> <tr> <td>ج</td> <td>ب</td> <td>د</td> <td>أ</td> <td>ـ</td> <td>ـ</td> </tr> </table>	التعريف	1- مبيد كيميائي	2- كسب	3- حرث	4- تسميد كيميائي	الحرف المقابل للتعريف	ج	ب	د	أ	ـ	ـ
التعريف	1- مبيد كيميائي	2- كسب	3- حرث	4- تسميد كيميائي	الحرف المقابل للتعريف									
ج	ب	د	أ	ـ	ـ									

	المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني: (15 نقطة)	
النقطة	التمرين الأول: (5 نقاط)	رقم السؤال
0,25 ن	<p>وصف النتائج التجريبية المحصلة:</p> <p>- عند زرع نواة ططلب Am في الوبير الجذري لططلب Ac مزال النواة يتم تجديد قبعة من نوع Am وينمو الططلب.....</p> <p>- عند زرع نواة ططلب Ac في الوبير الجذري لططلب Am مزال النواة يتم تركيب قبعة من نوع Ac وينمو الططلب.....</p> <p>استنتاج: تحكم النواة في شكل القبعة ونمو الططلب.</p>	1
0,25 ن	<p>أ- المعلومات التي يمكن استخلاصها من معطيات الوثيقة 2:</p> <p>- تنفذ البشائر المشعة التي تدخل في تركيب ARN من خارج الخلية (الطلطلب) إلى النواة.....</p> <p>- تنتقل البشائر المشعة لـ ARN من النواة إلى قمة الططلب.....</p>	2
0,5 ن 0,25 ن	<p>ب- دور ARNm :</p> <p>- قبل إضافة ARNm في الوسط لا يتم تركيب البروتينات، و مباشرة بعد إضافة ARNm (في الدقيقة 30) يتم تركيب البروتينات.....</p> <p>استنتاج: يتدخل ARNm في تركيب البروتينات .</p>	
0,25 ن 0,25 ن 0,5 ن	<p>كيف تتدخل النواة في تركيب القبعة:</p> <p>- التجربة 2: تؤدي المعالجة ببلريبونيكلياز إلى عدم تركيب القبعة، يدل هذا على أن تركيب بروتينات القبعة يتطلب وجود ARNm.....</p> <p>- التجربة 3: تؤدي المعالجة بالأكتينوميسين إلى عدم تركيب الساق والقبعة، وبالتالي يستلزم تركيب البروتينات نسخ ARNm انطلاقاً من ADN.....</p> <p>في النواة يتم نسخ ARNm انطلاقاً من ADN ثم ينتقل ARNm إلى السيتوبلازم حيث يتم تركيب البروتينات التي تعطي القبعة.....</p>	3
0,25 ن 0,25 ن 0,25 ن 0,25 ن 0,75 ن	<p>العلاقة مورثة - بروتين - صفة:</p> <p>متالية الأحماس الأمينية التي يرمز لها جزء خبيط ADN عند صنف النبات العادي:</p> <p>ACA GGU ACA UGG ACU ACA GUA UGG :ARNm Thr - Gly - Thr - Trp - Thr - Val - Trp الجزء البروتيني:</p> <p>متالية الأحماس الأمينية التي يرمز لها جزء خبيط ADN عند صنف النبات الطافر:</p> <p>ACA GGU ACA UAG ACU ACA GUA UGG :ARNm Thr - Gly - Thr الجزء البروتيني:</p> <p>حدث طفرة باستبدال لدى الصنف الطافر حيث استبدلت القاعدة C ب T على مستوى الثلاثية 66 أدت إلى ظهور الوحدة الرمزية بدون معنى وبالتالي تركيب بروتين Rubisco غير مكتمل (غير وظيفي) يؤدي إلى نمو ضعيف.</p>	4

النقطة	التمرين الثاني: (5 نقط)	رقم السؤال
0.5 ن	<p>مقارنة ظاهر وعدد الصبغيات بين خلايا ذكر وأنثى ذباب الخل:</p> <p>تتوفر خلايا ذباب الخل عند كل من الذكر والأنثى على أربعة أزواج من الصبغيات؛ ثلاثة أزواج من الصبغيات لاجنسية متماثلة (AA) وزوج من الصبغيات الجنسية XY عند الذكر (الشكل - أ) وXX عند الأنثى (الشكل - ب-).</p> <p>الصيغة الصبغية للأمشاج المنتجة بعد الانقسام الاختزالي.</p> <ul style="list-style-type: none"> - عند الذكر: $n = 3 A + X$ و $n = 3 A + Y$ - عند الأنثى: $n = 3 A + X$ - 	1
0.25 ن	<p>رسم تخططي للطور الانفصالي الأول من الانقسام الاختزالي: (تخصيص 0.5 ن) بالنسبة للرسم التخططي و (0.5 ن) للمفتاح).</p>  <p>رسم تخططي للطور الانفصالي الأول من الانقسام الاختزالي</p>	2
0.25 ن	<p>تحليل واستنتاجات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - هجونة أحادية: دراسة انتقال صفة واحدة (لون العيون). - عدم تجانس المظهر الخارجي (لون العيون) بين ذكور وإناث أفراد الجيل F_1; لا يتحقق القانون الأول لمendel، نستنتج أن المورثة المسئولة عن لون العيون مرتبطة بالجنس. - ترث الإناث صبغي X من الآباء الذكور وهو يحمل الحليل عيون حمراء وصبغي X من الآباء الإناث وهو يحمل الحليل عيون بيضاء، والمظهر الخارجي للإناث في F_1 (عيون حمراء) هو نفس المظهر الخارجي للأباء الذكور (عيون حمراء). إذا المورثة المسئولة عن لون العيون محمولة على الصبغي الجنسي X. - نستنتج أن الحليل المسؤول عن لون العيون حمراء (R) سائد بالنسبة للحليل المسؤول عن لون العيون بيضاء (r). 	3

النقطة	القمرين الثاني: نتمة	رقم السؤال																																						
0.25 ن	<p>التفسير الصبغي لنتيجة التزاوج الثاني وشبكة التزاوج:</p> $F_1 \times F_1$ <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">$\text{♂ } [r]$</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">$\text{♀ } [R]$</td> <td style="text-align: right;">المظهر الخارجي</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$X_r Y$</td> <td></td> <td style="text-align: center;">$X_R X_r$</td> <td style="text-align: right;">النمط الوراثي</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">↙ ↘</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X_r</td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td style="text-align: center;">X_R</td> <td style="text-align: right;">الأمشاج المنتجة</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: right;">النسب المئوية</td> </tr> </table> <p>.....</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: fit-content;"> <tr> <td style="text-align: center;">$\gamma \text{♂}$</td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td style="text-align: center;">X_r</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\gamma \text{♀}$</td> <td style="text-align: center;">$\frac{1}{2}$</td> <td style="text-align: center;">$\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$X_R \quad \frac{1}{2}$</td> <td style="text-align: center;">$X_R \text{ } Y \text{ } \text{♂ } [R]$</td> <td style="text-align: center;">$X_R \text{ } X_r \text{ } \text{♀ } [R]$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$X_r \quad \frac{1}{2}$</td> <td style="text-align: center;">$X_r \text{ } Y \text{ } \text{♂ } [r]$</td> <td style="text-align: center;">$X_r \text{ } X_r \text{ } \text{♀ } [r]$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </table> <p>.....</p>	$\text{♂ } [r]$	×	$\text{♀ } [R]$	المظهر الخارجي	$X_r Y$		$X_R X_r$	النمط الوراثي			↙ ↘		X_r	Y	X_R	الأمشاج المنتجة	50%	50%	50%	النسب المئوية	$\gamma \text{♂}$	Y	X_r	$\gamma \text{♀}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$X_R \quad \frac{1}{2}$	$X_R \text{ } Y \text{ } \text{♂ } [R]$	$X_R \text{ } X_r \text{ } \text{♀ } [R]$		25%	25%	$X_r \quad \frac{1}{2}$	$X_r \text{ } Y \text{ } \text{♂ } [r]$	$X_r \text{ } X_r \text{ } \text{♀ } [r]$		25%	25%	4
$\text{♂ } [r]$	×	$\text{♀ } [R]$	المظهر الخارجي																																					
$X_r Y$		$X_R X_r$	النمط الوراثي																																					
		↙ ↘																																						
X_r	Y	X_R	الأمشاج المنتجة																																					
50%	50%	50%	النسب المئوية																																					
$\gamma \text{♂}$	Y	X_r																																						
$\gamma \text{♀}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$																																						
$X_R \quad \frac{1}{2}$	$X_R \text{ } Y \text{ } \text{♂ } [R]$	$X_R \text{ } X_r \text{ } \text{♀ } [R]$																																						
	25%	25%																																						
$X_r \quad \frac{1}{2}$	$X_r \text{ } Y \text{ } \text{♂ } [r]$	$X_r \text{ } X_r \text{ } \text{♀ } [r]$																																						
	25%	25%																																						
0.5 ن	<p>يتكون الجيل F_2 من:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: fit-content;"> <thead> <tr> <th>النتائج التجريبية</th> <th>النتائج النظرية</th> <th>المظاهر الخارجية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$(118 \div 475) \times 100 = 24.84\%$</td> <td>25%</td> <td>ذكور بعيون حمراء [R]</td> </tr> <tr> <td>$(119 \div 475) \times 100 = 25.05\%$</td> <td>25%</td> <td>ذكور بعيون بيضاء [r]</td> </tr> <tr> <td>$(115 \div 475) \times 100 = 24.21\%$</td> <td>25%</td> <td>إناث بعيون حمراء [R]</td> </tr> <tr> <td>$(123 \div 475) \times 100 = 25.89\%$</td> <td>25%</td> <td>إناث بعيون بيضاء [r]</td> </tr> </tbody> </table> <p>النتائج النظرية تتوافق مع النتائج التجريبية.</p>	النتائج التجريبية	النتائج النظرية	المظاهر الخارجية	$(118 \div 475) \times 100 = 24.84\%$	25%	ذكور بعيون حمراء [R]	$(119 \div 475) \times 100 = 25.05\%$	25%	ذكور بعيون بيضاء [r]	$(115 \div 475) \times 100 = 24.21\%$	25%	إناث بعيون حمراء [R]	$(123 \div 475) \times 100 = 25.89\%$	25%	إناث بعيون بيضاء [r]																								
النتائج التجريبية	النتائج النظرية	المظاهر الخارجية																																						
$(118 \div 475) \times 100 = 24.84\%$	25%	ذكور بعيون حمراء [R]																																						
$(119 \div 475) \times 100 = 25.05\%$	25%	ذكور بعيون بيضاء [r]																																						
$(115 \div 475) \times 100 = 24.21\%$	25%	إناث بعيون حمراء [R]																																						
$(123 \div 475) \times 100 = 25.89\%$	25%	إناث بعيون بيضاء [r]																																						
0.25 ن	<p>إنجاز الدورة الصبغية لذباب الخل:</p>  <p>الدورة الصبغية لذباب الخل</p> <p>نطط الدورة عند ذباب الخل : دورة ثنائية الصبغية الصبغية.</p> <p>التعليق: مبشرة بعد الانقسام الاختزالي يحدث الإخصاب.</p>	5																																						
0.25 ن																																								
0.25 ن																																								

الرقطة	التمرين الثالث: (5 نقاط)	رقم السؤال
0.25 ن 0.25 ن 0.5 ن	<p>أثر طرح المياه العادمة على مياه البحيرة قبل 1965:</p> <p>الوثيقة 1: ارتفاع كمية الفوسفور في المياه العادمة إلى حوالي 90 طن في السنة وارتفاع هذه الكمية في مياه البحيرة إلى حوالي 120 طن في السنة.....</p> <p>الوثيقة 2: ارتفاع كمية الطحالب إلى حوالي $10 \text{ mm}^3/\text{L}$ التفسير: يسبب تصريف المياه العادمة المحملة بالفوسفور إلى ارتفاع كمية هذه المادة في البحيرة، الأمر الذي يجعل منها وسطاً خصباً لتكاثر الطحالب (التخاصب).</p>	1
0.25 ن 0.25 ن 1 ن	<p>وصف تطور كمية السمك المصطاد:</p> <p>- ترتفع كمية السمك المصطاد لتصل ذروتها سنة 1954 (أكثر من 60 طن في السنة) ثم عرفت هذه الكمية انخفاضاً كبيراً للتعدم تقريباً سنة 1970.</p> <p>- ينخفض تركيز O_2 المذاب في المياه العميقة للبحيرة حيث انتقلت من 0.36 mg/L سنة 1956 إلى 0.10 mg/L سنة 1966.</p> <p>التفسير: - ارتفاع حمولة المياه من الأملاح المعدنية وتکاثر الطحالب الزرقاء؛ - موت الطحالب وارتفاع حمولة المياه من المواد العضوية (التخاصب)؛ - تکاثر بكتيريات مؤكسدة للمواد العضوية مما يؤدي إلى انخفاض تركيز O_2 المذاب في المياه العميقة للبحيرة؛ - موت الأسماك التي تعيش في البحيرة وبالتالي انخفاض كمية المصطادة.</p>	2
1 ن	<p>وصف مراحل معالجة المياه العادمة. (تمنح النقطة كاملة في حالة وصف كامل لهذه المراحل وتخصم نقطة جزئية 0.25 ن عن كل حالة إغفال).</p> <ul style="list-style-type: none"> - معالجة أولية (فيزيائية): إزالة الأجسام الصلبة والدهون والرمل؛ - تصفيق أولي: إزالة الأوحال الأولية؛ - تهوية ومعالجة بإضافة المكتريات للماء (معالجة بيولوجية)؛ - تصفيق ثانوي: إزالة أوحال المياه المعالجة؛ - معالجات مكملة للماء وطرحه في النهر؛ - معالجة الأوحال وإنتاج الميثان والأسمدة. 	3
0.5 ن 0.5 ن	<p>أ. أهم التغيرات الملاحظة بعد إنشاء محطة المعالجة.</p> <p>الوثيقة 6: انخفاض تركيز الفوسفور في مياه البحيرة من $18.5 \mu\text{g/L}$ إلى $11 \mu\text{g/L}$.</p> <p>الوثيقة 7: انخفاض نسبة الطحالب الزرقاء من 86.30% إلى 0.22% وارتفاع نسبة المنشطرات من 12.21% إلى 95.55%.</p>	4
0.5 ن	<p>بـ. تأثير إنشاء محطة المعالجة على بحيرة Annecy.</p> <p>بوجود محطة المعالجة تنخفض كمية الفوسفور الآتي من المياه العادمة وبالتالي ينخفض تركيزه في البحيرة وهو ما يؤدي إلى تراجع ظاهرة التخاصب وبالتالي استرجاع البحيرة لظروفها البيئية الطبيعية. يترجم ذلك بارتفاع كمية ثاني الأوكسجين المذاب في مياه البحيرة وتحسين شفافية الماء، وارتفاع كمية السمك المصطاد.</p>	