

← الدالة اللوغاريتمية النبيرة

◆ تعريف:

الدالة الأسية النبيرة هي الدالة العكسية للدالة اللوغاريتمية النبيرة

و يرمز لها بالرمز:  $\exp$

نضع لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

$$\exp(x) = e^x$$

◆ استنتاجات و خاصيات:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R}$ $e^x \times e^y = e^{x+y}$ $(r \in \mathbb{Q}) \quad (e^x)^r = e^{rx}$ $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 0$ $\forall x \in \mathbb{R} \quad \ln(e^x) = x$
	$\forall x \in ]0, +\infty[ \quad e^{\ln x} = x$
	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in ]0; +\infty[$ $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y$
	$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$

◆ مجموعة التعريف:

مجموعة تعريف الدالة $f$ هي:	الدالة $f$ معرفة كما يلي:
$D_f = \mathbb{R}$	$f(x) = e^x$
$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u\}$	$f(x) = e^{u(x)}$

◆ نهايات أساسية:

$(n \in \mathbb{N}^*)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x}{x^n} \right) = +\infty$
	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^n e^x) = 0$
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

◆ الانصال:

الدالة  $x \mapsto e^x$  متصلة على  $\mathbb{R}$

لتكن  $u$  دالة معرفة على مجال  $I$   
 إذا كانت  $u$  متصلة على المجال  $I$  فإن الدالة  $x \mapsto e^{u(x)}$  متصلة على المجال  $I$



## الاشتقاق:


$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (e^x)' = e^x \text{ ولدينا: } \mathbb{R} \text{ قابلة للاشتقاق على}$$

لتكن  $u$  دالة معرفة على مجال  $I$

إذا كانت  $u$  قابلة للاشتقاق على المجال  $I$  فإن: الدالة  $x \mapsto e^{u(x)}$  قابلة للاشتقاق على المجال  $I$

$$\forall x \in I \quad (e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)} \text{ ولدينا:}$$

## النموذج الطيباني للدالة $\ln$ :



← الدالة الأسية للأساس  $a$  حيث:  $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

**تعريف:** الدالة العكسية للدالة  $\log_a$  تسمى الدالة الأسية للأساس  $a$  ويرمز لها بالرمز:  $\exp_a$

$$\exp_a(x) = a^x \quad \mathbb{R} \text{ نضع لكل } x \text{ من}$$

## استنتاجات وخصائص:

$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2$ $a^x \times a^y = a^{x+y}$ $(r \in \mathbb{Q}) \quad (a^x)^r = a^{rx}$ $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad a^x = e^{x \ln a}$ $\log_a(a^x) = x$
	$\forall x \in ]0; +\infty[ \quad a^{\log_a(x)} = x$
	$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$
	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in ]0; +\infty[$ $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a(y)$

## نهايات و منقنات:

$0 < a < 1$	$a > 1$
$a^x < a^y \Leftrightarrow x < y$	$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	

$$(a^x)' = (\ln a) \times a^x$$

## المشتقة:

