

المادة: الرياضيات

ملخص لدرس الممتاليات التراجعية

مستوى: السنة الثانية من سلك الباكالوريا

- شعبة التعليم الأصيل: مسلك العلوم الشرعية و مسلك اللغة العربية
- شعبة الآداب و العلوم الإنسانية: مسلك الآداب و مسلك العلوم الإنسانية

١. الممتاليات الحسابية: تذكير

تمرين 1

لاحظ ثم أتم بأربعة أعداد ملائمة لتسليط كل ممتالية من الممتاليات التالية :

$$\begin{array}{ll} \dots, 10, 8, 6, 4, 2, 0 & .1 \\ \dots, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6 & .2 \\ \dots, 243, 81, 27, 9, 3, 1 & .3 \\ \dots, \frac{1}{32}, \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1 & .4 \\ \dots, 64, 32, 16, 9, 4, 2, 1 & .5 \end{array}$$

مثال 1 : نعتبر الممتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالصيغة الصريحة التالية : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2n - 1$

- أحسب حدها الأول u_0
- أحسب الحدود الأربع الأولى للممتالية $(u_n)_{n \geq 1}$
- $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n$ أحسب

١. تعريف :

نقول إن $(u_n)_{n \geq 1}$ ممتالية حسابية إذا وجد عدد حقيقي r بحيث : $\forall n \geq n_0 \quad u_{n+1} = u_n + r$ العدد الحقيقي r يسمى أساس الممتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$

تمرين 2 : نعتبر الممتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2n + 3$

1. أحسب : $u_{n+1} - u_n$
2. ماذا تستنتج ؟

٢. صيغة الحد العام للممتالية بدلالة n :

إذا كانت (u_n) ممتالية حسابية أساسها r وحدها الأول u_{n_0} فإن : $u_n = u_{n_0} + (n - n_0)r$

نتيجة : إذا كانت $(u_n)_{n \geq n_0}$ ممتالية حسابية أساسها r فإن : $u_n = u_p + (n - p)r$ لكل $p \geq n_0$ و $n \geq n_0$

٣. مجموع حدود متتابعة لممتالية حسابية :

لتكن $(u_n)_{n \geq 1}$ ممتالية حسابية

نضع $n > p \geq n_0 \quad S_n = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_n$ حيث

$$S_n = (n - p + 1) \left(\frac{u_n + u_p}{2} \right) \quad \text{لدينا}$$

المجموع $S_n = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_n$ يحتوي على $(n - p + 1)$ حد

تمرين 3 :

1. لتكن (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = \frac{1}{2}$ و حدتها الأول $u_0 = 1$

أحسب المجموع التالي : $S_1 = u_3 + u_4 + u_5 + \dots + u_{30}$

2. لتكن (u_n) متتالية حسابية أساسها $-2 = r$ و حدتها الأول $u_0 = 4$

أحسب المجموع التالي : $S_2 = u_7 + u_8 + u_9 + \dots + u_{25}$

تمرين 4 : تعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالصيغة التالية :

1. تحقق أن $(u_n)_{n \geq 0}$ حسابية

2. أحسب المجموع : $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$

II. المتتاليات الهندسية

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالصيغة الصريحة التالية :

1. أحسب حدتها الأول u_0

2. أحسب $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

3. مادا تستنتج ؟

1. تعريف:

نقول إن $(u_n)_{n \in I}$ متتالية هندسية إذا وجد عدد حقيقي q بحيث :

العدد الحقيقي q يسمى أساس المتتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$

تمرين 5 : نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي :

بين أن (u_n) متتالية هندسية و حدد أساسها و حدتها الأول

2. صيغة الحد العام للمتتالية بدلالة n :

إذا كانت (u_n) متتالية هندسية أساسها q غير منعدم و حدتها الأول u_{n_0} فان :

نتيجة : إذا كانت $(u_n)_{n \geq n_0}$ متتالية هندسية أساسها q غير منعدم فان :

3. مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية :

لتكن $(u_n)_{n \in I}$ متتالية هندسية أساسها q غير منعدم نضع

حيث $p \geq n_0$ لدينا :

$$S_n = u_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right) \quad \bullet$$

$$S_n = (n - p + 1) \times u_p \quad \bullet$$

تمرين 6 :

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالصيغة التالية :

1. تتحقق أن $(u_n)_{n \geq 0}$ هندسية

2. أعبر عن U_n بدلالة n

3. أحسب المجموع : $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_6$

III. المتاليات من صنف

مثال : نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة بالعلاقة الترجعية التالية:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

أحسب الحدود الأربع الأولى للمتالية (u_n)
ملاحظة : هذه المتالية تسمى متالية ترجمية

تمرين 7 : نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة بالعلاقة:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 8$$

1. نفترض أن: $u_0 = 12$ أحسب u_1 و u_2 و u_3
2. نفترض أن: $u_0 = 3$ أحسب u_1 و u_2 و u_3

تمرين 8 : نعتبر المتالية الترجعية (u_n) المعرفة كالتالي:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n} \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

تمرين 9 : نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي:

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1 \\ u_0 = 10 \end{cases}$$

ونعتبر المتالية العددية (v_n) المعرفة كالتالي:

1. أحسب v_0 و v_1 و v_2

2. أحسب $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ و استنتج طبيعة المتالية (v_n)

3. أكتب v_n بدلالة n

4. استنتاج u_n بدلالة n

5. أحسب بدلالة n المجموع:

$$S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

تمرين 10 : نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + 2 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

ونعتبر المتالية العددية (v_n) المعرفة كالتالي:

1. أحسب v_0 و v_1

2. أحسب $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ و استنتاج طبيعة المتالية (v_n)

3. أكتب v_n بدلالة n

4. استنتاج u_n بدلالة n

5. أنشئ في معلم متعدد منظم المستقيم ذو المعادلة: $y = x$ و المستقيم ذو المعادلة:

6. مثل مبيانيا الحدود الخمسة الأولى للمتالية (u_n)

تمرين 11 : نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 5^n - 1$$

1. أحسب u_1 و u_2 و u_3

2. بين أن:

تمرين 12 : نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2 \times 3^n - 1$$

1. أحسب u_1 و u_2 و u_3

2. بين أن:

تمرين 13

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 1 \\ u_0 = 3 \end{cases}$$

: نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n - \frac{2}{3} \quad \text{المعرفة كالتالي : } (v_n)$$

1. أحسب v_0 و v_1

$$2. \text{ بين أن } (v_n) \text{ متالية هندسية أساسها } -\frac{1}{2}$$

3. أكتب v_n بدلالة n

4. استنتج u_n بدلالة n

5. أنشئ في معلم معتمد منظم المستقيم ذو المعادلة : $y = x$ و المستقيم ذو المعادلة :

6. مثل مبيانيا الحدود الخمسة الأولى للمتالية (u_n)

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{2} \\ u_0 = 3 \end{cases}$$

: نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n + 1 \quad \text{المعرفة كالتالي : } (v_n)$$

1. أحسب u_1 و u_2 و v_0 و v_1

$$2. \text{ بين أن } (v_n) \text{ متالية هندسية أساسها } \frac{1}{2}$$

3. أكتب v_n بدلالة n

4. استنتاج u_n بدلالة n

$$5. \text{ أحسب : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = 3u_n + \frac{3}{2} \\ u_0 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

: نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n + \frac{3}{4} \quad \text{المعرفة كالتالي : } (v_n)$$

1. أحسب u_1 و u_2 و v_0 و v_1

$$2. \text{ بين أن } (v_n) \text{ متالية هندسية أساسها } 3$$

3. أكتب v_n بدلالة n

$$4. \text{ استنتاج أن : } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{13}{12} \times 3^n - \frac{3}{4}$$

$$5. \text{ أحسب : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 2 \\ u_0 = -1 \end{cases}$$

: نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n - \frac{8}{3} \quad \text{المعرفة كالتالي : } (v_n)$$

1. أحسب v_0 و v_1

2. بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها : $\frac{1}{4}$

3. أكتب v_n بدلاً

4. استنتج u_n بدلاً

5. أحسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

6. بين أن :

$$v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{n-1} = -\frac{44}{9} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$$

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} = -\frac{44}{9} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right) + \frac{8}{3}n$$

7. بين أن :