






سلسلة تمارين الكيمياء
السنة الثانية بكالوريا 2007-2008
التحولات السريعة والتحولات البطيئة
العوامل الحركية

تمرين 1

أكتب نصف معادلة الأكسدة - اختزال المقرنة بكل مزدوجة من المزدوجات التالية ، مع تحديد النوع المؤكسد والنوع المختزل .

**تمرين 2**

ندخل قطعة صغيرة من ورق الألومنيوم $\text{Al}_{(\text{s})}$ في ثبائي البروم $\text{Br}_{2(\ell)}$ السائل ، فيحدث تفاعل ينتج عنه برومور الألومنيوم المكون من الأيونات Br^- و $\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+}$.

1 - ما هي المزدوجتان مختزل / مؤكسد المتدخلتان في هذا التفاعل ؟

2 - أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل .

3 - أحسب الكتلة القصوى للألومنيوم التي تتفاعل مع 2ml من ثبائي البروم .
نعطي كثافة ثبائي البروم $1\text{g}/\text{ml}$ و $\text{M}(\text{Br})=80\text{g/mol}$ و $\text{M}(\text{Al})=27\text{g/mol}$ و $d=3,1$.

تمرين 3

لدراسة بعض العوامل الحركية المؤثرة على تفاعل فوق أوكسيد الهيدروجين أو الماء الأوكسيجيني مع أيونات اليودور في وسط حمضي نجح ثلث تجارب حسب الظروف البدئية التالية :


التجربة (1) : درجة الحرارة 25°C و $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,05\text{ mol/l}$ و $[\text{I}_2] = 0,05\text{ mol/l}$

التجربة 2 : درجة الحرارة 25°C و $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,10\text{ mol/l}$ و $[\text{I}_2] = 0,10\text{ mol/l}$

التجربة (3) : درجة الحرارة 50°C و $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,10\text{ mol/l}$ و $[\text{I}_2] = 0,10\text{ mol/l}$

يبين الشكل أسفله منحنى تطور تركيز ثبائي اليود I_2 المتكون بدلاة الزمن بالنسبة لكل تجربة

1 - أكتب معادلة تفاعل الأكسدة - اختزال بين المزدوجتين



2 - عين المنحنى الموافق لكل تجربة . علل أجوبتك .

تمرين 4

للماء الأوكسيجيني أو فوق أوكسيد الهيدروجين (H_2O_2) خاصيات مؤكسد - مختزل في آن واحد ، فهو يتفكك حسب تفاعل أكسدة - اختزال ذاتي . dismutation


المزدوجتان المتفاعلتان هما $\text{O}_{2(g)} / \text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$ و $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})} / \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

1 - أكتب معادلة تفاعل أكسدة - اختزال الحاصل أثناء تفكك الماء الأوكسيجيني .

2 - لماذا يسمى بتفاعل أكسدة - اختزال ذاتي ؟

3

المنزلية ؟

*** تمرين 5**

نريد تحديد النسبة الكتليلية لأوكسيد القصدير $\text{SnO}_2(s)$ في معدن ما للقصدير .

- 1 - نأخذ عينة كتلتها $m=0,44\text{g}$ من هذا المعدن ، بعد سحقه ومعالجته في وسط حمضي وساخن بواسطة مسحوق الرصاص $(\text{Pb})_{(s)}$ بوفرة ، فنحصل على محلول S يتكون أساساً من أيونات القصدير II^{+} وأيونات الرصاص II^{-} .

1 - 1

2 - 1

المعادلة الكيميائية الحصيلة . ما هو الدور الذي يلعبه الرصاص ؟ (مؤكسد أم مختزل)

- 2 - نعتبر أن الرصاص لا يتفاعل إلا مع أوكسيد القصدير II المتواجد في العينة . عند نهاية التفاعل نقوم بعزل الجسم الصلب النتبقي وبعد تنظيفه نضيفه إلى محلول S .

نعاير محلول S المحصل عليه بواسطة محلول ثانائي كرومات البوتاسيوم $(2\text{K}^{+}_{(aq)} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}_{(aq)})$ تركيزه

$C = 0,020\text{ mol/l}$. خلال تفاعل المعايرة يتحول عنصر القصدير إلى أوكسيد القصدير II

2 - 1 ما هو الجسم الصلب المتبقى والذي تمت إضافته إلى محلول S ؟ لماذا ؟

2 - 2 أثبتت نصف المعادلة أكسدة - اختزال للمزدوجة $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}_{(aq)} / \text{Cr}^{3+}_{(aq)}$.

2 - 3 استنتج المعادلة الكيميائية الحصيلة للتفاعل خلال معايرة محلول S بواسطة محلول ثانائي كرومات البوتاسيوم .

3 - نحصل على التكافؤ ، عندما يتم إضافة حجم $V_E = 21,7\text{cm}^3$ من محلول ثانائي كرومات البوتاسيوم .

$$C \cdot V_E = \frac{n_i(\text{Si}^{2+})}{3}$$

$n_i(\text{Si}^{2+})$ كمية المادة البدئية لأيونات القصدير II^{-} .

3 - 2 استنتاج النسبة الكتليلية لأوكسيد القصدير II في المعدن المدروس .

نعطي $M(\text{Sn})=118,7\text{g/mol}$

تمرين 6 *

نعتبر الأكسدة البطيئة لحمض الأوكساليك $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq)$ بواسطة أيونات البرمنغيات (aq) . $\text{MnO}_4(aq)$ بواسطة أيونات البرمنغيات (aq) .

عند اللحظة $t=0$ ، نمزج $V_0 = 25\text{ml}$ من محلول برميغيات البوتاسيوم تركيزه $C_0 = 1,0 \cdot 10^{-2}\text{ mol/l}$

وحجم $V = 20\text{ml}$ من حمض الأوكساليك تركيزه $C_r = 1,0 \cdot 10^{-1}\text{ mol/l}$ ونضيف $V = 5,0\text{ml}$ ونضيف من حمض الكبريتيك لجعل الوسط التفاعلي حمضي .

1

واستنتاج المعادلة الكيميائية الحصيلة .

2 - أذكر النوع الكيميائي المؤكسد والنوع الكيميائي المختزل خلال هذا التحول .

3 - أحسب كمية المادة البدئية للمتفاعلات المتداخلة في هذا التفاعل .

4 - حدد المتفاصل المحد .

5 - أوجد الحصيلة النهائية إذا اعتبرنا أن هذا التفاعل تام . واستنتاج تركيز أيونات المنغنيز عند نهاية التفاعل .



6

يتم إبراز تطور هذا التحول الكيميائي .

تصحيح السلسلة 1 الكيمياء التحولات الكيميائية



تمرين 1

نصف المعادلة الأكسدة والاختزال المقوونة بكل مزدوجة : *




*



أيون تتراتيونات و $S_2O_3^{2-}(aq)$: أيون ثيو كبريتات





*





*





أيون بيروكسو ثائي كبريتات : $S_2O_8^{2-}(aq)$





*



*






*



تمرين 2

1 – المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل :
و $Br_2(g) / Br^-(aq)$

2 – المعادلة الكيميائية للتفاعل :
المتفاعلين هما : Al وثنائي البروم . Br_2



3 - حساب الكتلة القصوى للألومنيوم :
نحسب كمية المادة البدئية لثنائي البروم :

$$n_0(Al) = \frac{m(Al)}{M(Al)}$$

$$d = \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V$$

$$n_0(Al) = \frac{\rho \cdot V}{M(Al)} = 0,039 mol$$

الجدول الوصفي لتفاعل باستعمال تقدم التفاعل x :

2Al	3Br ₂	2(AlBr ₃)	التقدم	
n ₀ (Al)	n ₀ (Br ₂)	0	0	بداية التفاعل
n ₀ (Al)-2x	0,039-3x	2x	x	خلال التفاعل
n ₀ (Al)-2x _{max}	0,039-3x _{max}	2x _{max}	x _{max}	نهاية التفاعل

للحصول على الكتلة القصوى للألومنيوم المتفاعل مع ثنائي البروم يجب أن تختفي كل المتفاعلات أي يجب أن يكون التفاعل متساوى المولات أو ستكميometrica :

$$0,039 - 3x_{max} = 0 \quad n_0(Al) - 2x_{max} = 0$$

من العلاقة الثانية نستنتج أن $x_{max} = 0,013 mol$ وبالتالي فإن



$$n_0(Al) - 2 \cdot 0,013 = 0 \Rightarrow n_0(Al) = 0,026 mol$$

$$n_0(Al) = \frac{m(Al)}{M(Al)} \Rightarrow m(Al) = 0,69 g$$


تمرين 3

1 - المعادلة الكيميائية :

حسب المعطيات المتفاعلين هما الماء الأوكسيجيني و أيونات اليودور I⁻ :



معادلة التفاعل هي :






2 - خلال التجربة (1) و (2) حافظنا على نفس درجة الحرارة وغيرها التركيز في المنحى

التزايدى أي أن تكون اليود فى التجربة (2) سيصل إلى نهاية التفاعل قبل (1)

في التجربة 3 أن تركيز المتفاعلات هو نفسه في التجربة (2) وغيرها درجة الحرارة في المنحى التزايدى ونعلم أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة تكون سرعة تطور التفاعل أكبر أي أن تكون اليود في التجربة (3) سيكون أسرع من (2) وبالتالي فالمنحى (أ) يمثل التجربة (3) والمنحى (ب) يمثل التجربة (2) والمنحى (ج) يمثل التجربة (1) .

تمرين 4

1 – معادلة التفاعل الأكسدة - اختزال الحاصل أثناء تفكك الماء :



2



3

في الشروط الاعتيادية يكون هذا التفاعل بطيء جدا .


تمرين 5

عناصر الأجوبة :

: 2 – 1



2 – 1 الرصاص . نعيده إلى محلول لكي يبقى أوكسيد القصدير هو المتفاعل المحدد .



1 – 3

المولات .

%(SnO_2)=45% : 2 – 3