

## حساب التكامل السلسلة 1 (14 تمرين)

### التمرين 1:

أحسب التكاملات التالية :

$$\begin{aligned} K &= \int_0^{\ln 2} e^x dx & (3) & \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx & (2) & \quad I = \int_0^1 (x^2 - x + 1) dx & (1) \\ N &= \int_0^1 x (x^2 - 1)^4 dx & (6) & \quad M = \int_0^4 \sqrt{x+3} dx & (5) & \quad L = \int_1^2 \frac{1}{x+1} dx & (4) \end{aligned}$$

### التمرين 2:

أحسب التكاملات التالية :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 |x-1| dx & (1) \\ J &= \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{|\ln x|}{x} dx & (2) \end{aligned}$$

### التمرين 3:

(1) أحسب القيمة المتوسطة لـ  $f(x) = \cos 2x$  على  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

(2) أدرس إشارة التكاملات التالية :

أ.  $I = \int_1^2 \frac{x^4}{1+x^2} dx$

ب.  $J = \int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx$

### التمرين 4:

أحسب التكاملات التالية :

(1)  $I = \int_0^1 x (x^2 + 3)^2 dx$

(2)  $J = \int_0^1 \frac{x-1}{(x^2 - 2x + 3)^2} dx$

(3)  $K = \int_0^2 \frac{2}{x+1} dx$

$$L = \int_1^2 \frac{x}{x+1} dx \quad (4)$$

$$M = \int_1^e \frac{\ln^2(x)}{x} dx \quad (5)$$

التمرين 5:

باستعمال مكالمة بالأجزاء أحسب التكاملات التالية :

$$\int_1^e x \ln x dx \quad (1)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx \quad (2)$$

$$\int_1^e \ln x dx \quad (3)$$

$$\int_0^1 \ln(x+1) dx \quad (4)$$

$$\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx \quad (5)$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \quad (6) \text{ باستخدام مكالمة بالأجزاء مرتين أحسب :}$$

التمرين 6:

$$f(x) = \frac{2}{x} \quad (1)$$

أحسب مساحة الحيز المحصور بين  $(C_f)$  و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين مهادلتهما على التوالي:  $x=1$  و  $x=4$

$$(2) \text{ في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم } (O, \vec{i}, \vec{j}) \text{ حيث } \|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$$

نعتبر الدالة  $f: x \mapsto 1 - e^{-x}$ . أحسب مساحة حيز المستوى المحصور بين منحنى الدالة  $f$  و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين معادلتهما على التوالي  $x = \ln 2$  و  $x = \ln 4$

$$(3) \text{ المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم } (O, \vec{i}, \vec{j}) \text{ حيث } \|\vec{i}\| = 1cm$$

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بما يلي:  $f(x) = x^2 - 2x$

أحسب مساحة حيز المستوى المحصور بين  $(C_f)$  و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين مهادلتهما على التوالي:

$$x=1 \text{ و } x=3$$

$$(4) \text{ المستوى منسوب إلى معلم متعامد } (O, \vec{i}, \vec{j}) \text{ حيث } \|\vec{i}\| = 3cm \text{ و } \|\vec{j}\| = 2cm$$

$$\text{نعتبر الدالتين العدديتين } f \text{ و } g \text{ المعرفتين بما يلي: } f(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1} + e^{-x} \text{ و } g(x) = e^{-x}$$

أحسب ب  $cm^2$  مساحة حيز المستوى المحصور بين منحنىي الدالتين  $f$  و  $g$  و المستقيمين اللذين معادلتهما على التوالي

$$x=0 \text{ و } x=\ln 2$$

التمرين 7:

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . لتكن  $f$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :  $f(x) = \sqrt{x(e^x - 1)}$   
أحسب  $V$  حجم المجسم المولد بدوران  $(C_f)$  حول محور الأفضيل على المجال  $[0,1]$ .

التمرين 8:

أحسب التكاملات التالية :

$$\int_1^2 \left( x^4 - \frac{1}{4}x^3 + 2x - 5 - \frac{1}{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} \right) dx \quad (1)$$

$$\int_0^1 3x(x^2 - 1)^4 dx \quad (2)$$

$$\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx \quad (3)$$

$$\int_0^1 \frac{x^5}{\sqrt[3]{x^6 + 1}} dx \quad (4)$$

$$\int_1^e \frac{\ln^2(x)}{x} dx \quad (5)$$

$$\int_2^3 \frac{x^3}{(x^4 - 1)^2} dx \quad (6)$$

$$\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad (7)$$

$$\int_0^1 \frac{x + 2}{x^2 + 4x + 3} dx \quad (8)$$

التمرين 9:

باستعمال مكالمة بالأجزاء أحسب التكاملات التالية :

$$\int_0^1 (x + 2)e^{-x} dx \quad (1)$$

$$\int_0^1 x \ln(x + 3) dx \quad (2)$$

$$(3) \text{ أ. تحقق أن لكل } x \text{ من } \mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\} \text{ لدينا : } \frac{1}{x(x^2 - 1)} = \frac{-1}{x} + \frac{x}{x^2 - 1}$$

$$\text{ب. أحسب } \int_2^3 \frac{1}{x(x^2 - 1)} dx$$

$$\text{ج. باستعمال مكالمة بالأجزاء أحسب التكامل : } \int_2^3 \frac{x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx$$

التمرين 10:

$$(1) \text{ باستعمال مكالمة بالأجزاء أحسب التكامل : } \int_0^1 x e^x dx$$

$$(2) \text{ باستعمال مكالمة بالأجزاء أحسب التكامل : } \int_0^1 x^2 e^x dx$$

$$(3) \text{ لتكن } f \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بما يلي : } f(x) = (x^2 + 4x + 4)e^x$$

أحسب مساحة الحيز المحصور بين  $(C_f)$  و محور الأفاصل و المستقيمين اللذين معادلتاهما  $x=1$  و  $x=0$

$$\left( \|\vec{i}\| = 1,5cm; \|\vec{j}\| = 2cm \right)$$

التمرين 11:

$$(1) \text{ تحقق أن الدالة } F : x \mapsto \frac{-\ln x}{x} - \frac{1}{x} \text{ دالة أصلية للدالة } f : x \mapsto \frac{\ln x}{x^2} \text{ على } ]0, +\infty[$$

$$(2) \text{ أحسب التكامل } \int_1^4 \frac{\ln x}{x^2} dx$$

التمرين 12:

$$(1) \text{ بين أن الدالة } H : x \mapsto x \ln x - x \text{ دالة أصلية للدالة } h : x \mapsto \ln x \text{ على } ]0, +\infty[$$

$$(2) \text{ أحسب : } \int_1^2 h(x) dx$$

$$(3) \text{ في معلم متعامد ممنظم } (O, \vec{i}, \vec{j}) \text{ حيث } \|\vec{i}\| = 2cm$$

أحسب مساحة الحيز المحصور بين  $(C_h)$  و محور الأفاصل و المستقيمين اللذين معادلتاهما  $x=1$  و  $x=2$

التمرين 13 :

أحسب التكامل :

$$\int_2^4 |\ln(x) - 1| dx$$

التمرين 14 :

(1) أحسب التكاملات التالية :

$$A = \int_1^2 (x^3 - 2x + 3) dx$$

$$B = \int_0^1 x (x^2 + 1)^2 dx$$

$$C = \int_0^2 \frac{1}{x+1} dx$$

$$D = \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{|\ln x|}{x} dx \quad (2) \text{ أحسب التكامل :}$$

$$(3) \text{ أ- تحقق أن : } \frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1} \quad (\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$$

$$E = \int_0^2 \frac{x^2}{x+1} dx \quad \text{ب- أحسب}$$

$$\text{ج- باستعمال مكالمة بالأجزاء استنتج قيمة التكامل : } F = \int_0^2 x \ln(x+1) dx$$

تصحيح التمرين 1:

(1)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x^2 - x + 1) dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 \\ &= \left( \frac{1^3}{3} - \frac{1^2}{2} + 1 \right) - \left( \frac{0^3}{3} - \frac{0^2}{2} + 0 \right) \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx \\ &= \left[ -\frac{1}{2} \cos(2x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left( -\frac{1}{2} \cos(\pi) \right) - \left( -\frac{1}{2} \cos(0) \right) \\ &= \left( -\frac{1}{2}(-1) \right) - \left( -\frac{1}{2}(1) \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} K &= \int_0^{\ln(2)} e^x dx \\ &= \left[ e^x \right]_0^{\ln(2)} \\ &= \left( e^{\ln(2)} \right) - \left( e^0 \right) \\ &= (2) - (1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}L &= \int_1^2 \frac{1}{x+1} dx \\&= \int_1^2 \frac{(x+1)'}{x+1} dx \\&= [\ln|x+1|]_1^2 \\&= (\ln(3)) - (\ln(2)) \\&= \ln\left(\frac{3}{2}\right)\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}M &= \int_0^4 \sqrt{x+3} dx \\&= \int_0^4 (x+3)^{\frac{1}{2}} dx \\&= \int_0^4 (x+3)'(x+3)^{\frac{1}{2}} dx \\&= \left[ \frac{(x+3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^4 \\&= \left[ \frac{2}{3}(x+3)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 \\&= \left( \frac{2}{3}(7)^{\frac{3}{2}} \right) - \left( \frac{2}{3}(3)^{\frac{3}{2}} \right) \\&= \frac{2}{3}(7\sqrt{7} - 3\sqrt{3})\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}
 N &= \int_0^1 x(x^2-1)^4 dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (2x)(x^2-1)^4 dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2-1)'(x^2-1)^4 dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[ \frac{(x^2-1)^5}{5} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{0^5}{5} - \frac{(-1)^5}{5} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \\
 &= \frac{1}{10}
 \end{aligned}$$

تصحيح التمرين 2:

$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$
$x-1$	$-$	$0$	$+$

(1)

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^2 |x-1| dx \\
 &= \int_0^1 |x-1| dx + \int_1^2 |x-1| dx \\
 &= \int_0^1 (-x+1) dx + \int_1^2 (x-1) dx \\
 &= \left[ \frac{-x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[ \frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 \\
 &= \left( \left( \frac{1}{2} \right) - (0) \right) + \left( (0) - \left( \frac{-1}{2} \right) \right) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

(2)

$x$	0	$1 + \infty$
$\ln(x)$	-	+

$$\begin{aligned}
 J &= \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{|\ln x|}{x} dx \\
 &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{|\ln x|}{x} dx + \int_1^e \frac{|\ln x|}{x} dx \\
 &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{-\ln x}{x} dx + \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx \\
 &= -\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} \ln x dx + \int_1^e \frac{1}{x} \ln x dx \\
 &= -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln'(x) \ln x dx + \int_1^e \ln'(x) \ln x dx \\
 &= -\left[ \frac{\ln^2(x)}{2} \right]_{\frac{1}{e}}^1 + \left[ \frac{\ln^2(x)}{2} \right]_1^e + \\
 &= -\left( (0) - \frac{(-1)^2}{2} \right) + \left( \frac{\ln^2(2)}{2} - (0) \right) \\
 &= \frac{1 + \ln^2(2)}{2}
 \end{aligned}$$

تصحيح التمرين 3:

(1)

$$\begin{aligned}
 \mu &= \frac{1}{\frac{\pi}{4} - 0} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2x) dx \\
 &= \frac{4}{\pi} \left[ \frac{1}{2} \sin(2x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= \frac{4}{\pi} \left( \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} \sin(0) \right) \\
 &= \frac{4}{\pi} \left( \frac{1}{2} - 0 \right) \\
 &= \frac{2}{\pi}
 \end{aligned}$$

(2) أ. بما أن  $x \mapsto \frac{x^4}{1+x^2}$  متصلة و موجبة على  $[1, 2]$  ( و  $1 < 2$  ) فإن  $\int_1^2 \frac{x^4}{1+x^2} dx \geq 0$

ب. بما أن  $x \mapsto \ln(x)$  متصلة و سالبة على  $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$  ( و  $\frac{1}{e} < 1$  ) فإن  $\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln(x) dx \leq 0$

**تصحيح التمرين 4 :**

(1)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x(x^2+3)^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (2x)(x^2+3)^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2+3)'(x^2+3)^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{(x^2+3)^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{64}{3} - \frac{27}{3} \right) \\ &= \frac{37}{6} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} J &= \int_0^1 \frac{x-1}{(x^2-2x+3)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x-2}{(x^2-2x+3)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2-2x+3)'}{(x^2-2x+3)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{-1}{x^2-2x+3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left( \left( \frac{-1}{2} \right) - \left( \frac{-1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{-1}{12} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 K &= \int_0^2 \frac{2}{x+1} dx \\
 &= 2 \int_0^2 \frac{1}{x+1} dx \\
 &= 2 \int_0^2 \frac{(x+1)'}{x+1} dx \\
 &= 2 [\ln|x+1|]_0^2 \\
 &= 2((\ln(3)) - (\ln(1))) \\
 &= 2\ln(3)
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 L &= \int_1^2 \frac{x}{x+1} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{x+1-1}{x+1} dx \\
 &= \int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx \\
 &= \int_1^2 \left(1 - \frac{(x+1)'}{x+1}\right) dx \\
 &= [x - \ln|x+1|]_1^2 \\
 &= (2 - \ln(3)) - (1 - \ln(2)) \\
 &= 1 + \ln(2) - \ln(3) \\
 &= 1 + \ln\left(\frac{2}{3}\right)
 \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
 M &= \int_1^e \frac{\ln^2(x)}{x} dx \\
 &= \int_1^e \frac{1}{x} \ln^2(x) dx \\
 &= \int_1^e \ln'(x) \ln^2(x) dx \\
 &= \left[ \frac{\ln^3(x)}{3} \right]_1^e \\
 &= \frac{\ln^3(e)}{3} - \frac{\ln^3(1)}{3} \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

تصحيح التمرين 5 :

(1) لنحسب  $\int_1^e x \ln x dx$

$$\begin{cases} U'(x) = x \\ V(x) = \ln(x) \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = \frac{x^2}{2} \\ V'(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \updownarrow$$

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln x dx &= \int_1^e U'(x) V(x) dx \\ &= [U(x) V(x)]_1^e - \int_1^e U(x) V'(x) dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^e - \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_1^e \\ &= \left( \frac{e^2}{2} \ln(e) - \frac{1^2}{2} \ln(1) \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{e^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

(2) لنحسب  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$

$$\begin{cases} U'(x) = \cos x \\ V(x) = x \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = \sin x \\ V'(x) = 1 \end{cases} \updownarrow$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx &= [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left( \left( \frac{\pi}{2} \right) - (0) \right) - ((0) - (-1)) \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

(3) نحسب  $\int_1^e \ln x dx$ .

لدينا :  $\int_1^e \ln x dx = \int_1^e 1 \times \ln(x) dx$

$$\begin{cases} U'(x) = 1 \\ V(x) = \ln x \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = x \\ V'(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \Downarrow$$

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln x dx &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \times \frac{1}{x} dx \\ &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx \\ &= [x \ln x]_1^e - [x]_1^e \\ &= (e - 0) - (e - 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

(4) نحسب  $\int_0^1 \ln(x+1) dx$ .

لدينا :  $\int_0^1 \ln(x+1) dx = \int_0^1 1 \times \ln(x+1) dx$

$$\begin{cases} U'(x) = 1 \\ V(x) = \ln(x+1) \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = x+1 \\ V'(x) = \frac{(x+1)'}{x+1} = \frac{1}{x+1} \end{cases} \Downarrow$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(x+1) dx &= [(x+1) \ln(x+1)]_0^1 - \int_0^1 (x+1) \times \frac{1}{x+1} dx \\ &= [(x+1) \ln(x+1)]_0^1 - \int_0^1 1 dx \\ &= [(x+1) \ln(x+1)]_0^1 - [x]_0^1 \\ &= (2 \ln(2) - 0) - (1 - 0) \\ &= 2 \ln(2) - 1 \end{aligned}$$

(5) نحسب  $\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ .

لدينا :  $\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int_e^{e^2} \frac{1}{\sqrt{x}} \times \ln x dx$

$$\begin{cases} U'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \\ V(x) = \ln(x) \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = 2\sqrt{x} \\ V'(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \Downarrow$$

$$\begin{aligned}
 \int_e^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= \left[ 2\sqrt{x} \ln x \right]_e^{e^2} - \int_e^{e^2} 2\sqrt{x} \times \frac{1}{x} dx \\
 &= \left[ 2\sqrt{x} \ln x \right]_e^{e^2} - 2 \int_e^{e^2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 &= \left[ 2\sqrt{x} \ln x \right]_e^{e^2} - 2 \left[ 2\sqrt{x} \right]_e^{e^2} \\
 &= \left( 2\sqrt{e^2} \ln(e^2) - 2\sqrt{e} \ln e \right) - 2 \left( 2\sqrt{e^2} - 2\sqrt{e} \right) \\
 &= \left( 4e - 2\sqrt{e} \right) - 2 \left( 2e - 2\sqrt{e} \right) \\
 &= 4e - 2\sqrt{e} - 4e + 4\sqrt{e} \\
 &= 2\sqrt{e}
 \end{aligned}$$

(6) لنحسب  $\int_0^1 x^2 e^x dx$  :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} U'(x) = e^x \\ V(x) = x^2 \end{cases} \nearrow \begin{cases} U(x) = e^x \\ V'(x) = 2x \end{cases} \Downarrow \\
 \int_0^1 x^2 e^x dx &= \left[ x^2 e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx \\
 &= \left[ x^2 e^x \right]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx \\
 &= e - 2 \int_0^1 x e^x dx
 \end{aligned}$$

لنحسب  $\int_0^1 x e^x dx$  :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} h'(x) = e^x \\ g(x) = x \end{cases} \nearrow \begin{cases} h(x) = e^x \\ g'(x) = 1 \end{cases} \Downarrow \\
 \int_0^1 x e^x dx &= \left[ x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\
 &= \left[ x e^x \right]_0^1 - \left[ e^x \right]_0^1 \\
 &= (e - 0) - (e - 1) = 1
 \end{aligned}$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \quad \text{و بالتالي :}$$

تصحيح التمرين 6

(1)

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^4 |f(x)| dx \cdot (U.A) \\
 &= \int_1^4 \left| \frac{2}{x} \right| dx \cdot (U.A) \\
 &= \int_1^4 \frac{2}{x} dx \cdot (U.A) \\
 &= 2 \int_1^4 \frac{1}{x} dx \cdot (U.A) \\
 &= 2 [\ln x]_1^4 \cdot (U.A) \\
 &= 2 (\ln(4) - \ln(1)) \cdot (U.A) \\
 &= 2 \ln(4) \cdot (U.A)
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{\ln 2}^{\ln 4} |f(x)| dx \cdot \|i^-\| \cdot \|j^-\| \\
 &= \int_{\ln 2}^{\ln 4} |1 - e^x| dx \cdot 2cm \cdot 2cm \\
 &= \int_{\ln 2}^{\ln 4} (e^x - 1) dx \cdot 4cm^2 \\
 &= \left[ e^x - x \right]_{\ln 2}^{\ln 4} \cdot 4cm^2 \\
 &= ((4 - \ln 4) - (2 - \ln 2)) \cdot 4cm^2 \\
 &= (2 - \ln 2) \cdot 4cm^2 \\
 &= (8 - 4\ln(2)) cm^2
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^3 |f(x)| dx \cdot \|i^-\| \cdot \|j^-\| \\
 &= \int_1^3 |x^2 - 2x| dx \cdot 1cm \cdot 1cm \\
 &= \left( \int_1^2 |x^2 - 2x| dx + \int_2^3 |x^2 - 2x| dx \right) cm^2 \\
 &= \left( \int_1^2 (2x - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx \right) cm^2 \\
 &= \left( \left[ x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 + \left[ \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 \right) cm^2 \\
 &= \left( \left( 4 - \frac{8}{3} \right) - \left( 1 - \frac{1}{3} \right) + (9 - 9) - \left( \frac{8}{3} - 4 \right) \right) cm^2 \\
 &= 2cm^2
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^{\ln 2} |f(x) - g(x)| dx \cdot \|i\| \cdot \|j\| \\
 &= \int_0^{\ln 2} \left| \frac{2e^x}{e^x + 1} \right| dx \cdot 2cm \cdot 3cm \\
 &= \int_0^{\ln 2} \left( \frac{2e^x}{e^x + 1} \right) dx \cdot 6cm^2 \\
 &= 2 \int_0^{\ln 2} \left( \frac{(e^x + 1)'}{e^x + 1} \right) dx \cdot 6cm^2 \\
 &= 12 \cdot [\ln |e^x + 1|]_0^{\ln 2} \cdot cm^2 \\
 &= 12 (\ln(3) - \ln(2)) \cdot cm^2 \\
 &= 12 \ln \left( \frac{3}{2} \right) cm^2
 \end{aligned}$$

**تصحيح التمرين 7:**

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 \pi f^2(x) dx \cdot (UV) \\
 &= \pi \int_0^1 x(e^x - 1) dx \\
 &= \pi \int_0^1 (xe^x - x) dx \cdot (UV) \\
 &= \pi \left( \int_0^1 xe^x dx - \int_0^1 x dx \right) \cdot (UV) \\
 &= \pi \left( 1 - \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \right) \cdot (UV) \\
 &= \pi \left( 1 - \left( \frac{1}{2} \right) \right) \cdot (UV) \\
 &= \frac{\pi}{2} (UV)
 \end{aligned}$$

( بالنسبة للتكامل  $\int_0^1 xe^x dx$  انظر تصحيح التمرين 5 السؤال 6 باستعمال مكاملة بالأجزاء :  $\int_0^1 xe^x dx = 1$  )

**تصحيح التمرين 8:**

$$\int_1^2 \left( x^4 - \frac{1}{4}x^3 + 2x - 5 - \frac{1}{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} \right) dx = \left[ \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{16} + x^2 - 5x + 8\sqrt{x} \right]_1^2$$
$$= 8\sqrt{2} - \ln(2) - \frac{379}{80}$$

$$\int_0^1 3x(x^2 - 1)^4 dx = \frac{3}{2} \int_0^1 2x(x^2 - 1)^4 dx$$
$$= \frac{3}{2} \int_0^1 (x^2 - 1)'(x^2 - 1)^4 dx$$
$$= \frac{3}{2} \left[ \frac{(x^2 - 1)^5}{5} \right]_0^1$$
$$= \frac{3}{10}$$

$$\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{3x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx$$
$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{(x^3 + 1)'}{\sqrt{x^3 + 1}} dx$$
$$= \frac{1}{3} \left[ 2\sqrt{x^3 + 1} \right]_0^1$$
$$= \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 2)$$
$$= \frac{2}{3} (\sqrt{2} - 1)$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{x^5}{\sqrt[3]{x^6+1}} dx &= \frac{1}{6} \int_0^1 6x^5 (x^6+1)^{-\frac{1}{3}} dx \\
 &= \frac{1}{6} \int_0^1 (x^6+1)' (x^6+1)^{-\frac{1}{3}} dx \\
 &= \frac{1}{6} \left[ \frac{(x^6+1)^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{6} \left[ \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x^6+1)^2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{6} \left( \frac{3}{2} \sqrt[3]{4} - \frac{3}{2} \right) \\
 &= \frac{\sqrt[3]{4}-1}{4}
 \end{aligned}$$

$$\int_1^e \frac{\ln^2(x)}{x} dx = \int_1^e \ln'(x) \ln^2(x) dx = \left[ \frac{\ln^3(x)}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} \quad (5)$$

(6)

$$\begin{aligned}
 \int_2^3 \frac{x^3}{(x^4-1)^2} dx &= \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{4x^3}{(x^4-1)^2} dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{(x^4-1)'}{(x^4-1)^2} dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[ \frac{-1}{x^4-1} \right]_2^3 \\
 &= \frac{19}{960}
 \end{aligned}$$

$$\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^4 (\sqrt{x})' e^{\sqrt{x}} dx = 2 \left[ e^{\sqrt{x}} \right]_1^4 = 2(e^2 - e) \quad (7)$$

(8)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x+2}{x^2+4x+3} dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+4}{x^2+4x+3} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2+4x+3)'}{x^2+4x+3} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ \ln|x^2+4x+3| \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 8 - \ln 3) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{8}{3} \right) \end{aligned}$$

**تصحيح التمرين 9:**

(1) لنحسب :  $\int_0^1 (x+2)e^{-x} dx$

$$\begin{cases} U'(x) = e^{-x} \\ V(x) = x+2 \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = -e^{-x} \\ V'(x) = 1 \end{cases} \updownarrow$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x+2)e^{-x} dx &= \left[ -(x+2)e^{-x} \right]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx \\ &= \left[ -(x+2)e^{-x} \right]_0^1 - \left[ -e^{-x} \right]_0^1 \\ &= (-3e^{-1}) - (-2) - (e^{-1} - 1) \\ &= 3 - 4e^{-1} \end{aligned}$$

(2) لنحسب :  $\int_0^1 x \ln(x+3) dx$

$$\begin{cases} U'(x) = x \\ V(x) = \ln(x+3) \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = \frac{x^2}{2} \\ V'(x) = \frac{1}{x+3} \end{cases} \updownarrow$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x \ln(x+3) dx &= \left[ \frac{x^2}{2} \ln(x+3) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{x+3} dx \\
 &= \left( \frac{1}{2} \ln 4 \right) - (0) - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2 - 3^2 + 3^2}{x+3} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln 4 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x-3)(x+3) + 9}{x+3} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln 4 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left( x - 3 + \frac{9(x+3)'}{x+3} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln 4 - \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} - 3x + 9 \ln|x+3| \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} \ln 4 - \left( \left( \frac{-5}{2} + 9 \ln 4 \right) - (9 \ln 3) \right) \\
 &= \frac{5}{4} - 4 \ln 4 + \frac{9}{2} \ln 3
 \end{aligned}$$

(3)

(أ) ليكن  $x$  من  $\mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\}$

$$\begin{aligned}
 \frac{-1}{x} + \frac{x}{x^2-1} &= \frac{-(x^2-1) + x^2}{x(x^2-1)} \\
 &= \frac{-x^2 + 1 + x^2}{x(x^2-1)}
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{x(x^2-1)} = \frac{-1}{x} + \frac{x}{x^2-1} : \text{إذن : لكل } x \text{ من } \mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\} \text{ لدينا :}$$

(ب)

$$\begin{aligned}
 \int_2^3 \frac{1}{x(x^2-1)} dx &= \int_2^3 \left( \frac{-1}{x} + \frac{x}{x^2-1} \right) dx \\
 &= \int_2^3 \left( \frac{-1}{x} + \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2-1} \right) dx \\
 &= \int_2^3 \left( \frac{-1}{x} + \frac{1}{2} \times \frac{(x^2-1)'}{x^2-1} \right) dx \\
 &= \left[ -\ln x + \frac{1}{2} \ln |x^2-1| \right]_2^3 \\
 &= \left( -\ln 3 + \frac{1}{2} \ln 8 \right) - \left( -\ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \right) \\
 &= \frac{-3}{2} \ln 3 + \frac{5}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

(ج) نحسب :  $\int_2^3 \frac{x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx$

$$\left\{ \begin{array}{l} U'(x) = \frac{x}{(x^2-1)^2} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{(x^2-1)^2} = \frac{(x^2-1)'}{(x^2-1)^2} \\ V(x) = \ln(x) \end{array} \right. \nearrow \left\{ \begin{array}{l} U(x) = \frac{-1}{2(x^2-1)} \downarrow \\ V'(x) = \frac{1}{x} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \int_2^3 \frac{x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx &= \left[ \frac{-1}{2(x^2-1)} \ln x \right]_2^3 - \int_2^3 \frac{-1}{2x(x^2-1)} dx \\
 &= \left( \frac{-1}{16} \ln 3 \right) - \left( \frac{-1}{6} \ln 2 \right) + \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{1}{x(x^2-1)} dx \\
 &= \frac{-1}{16} \ln 3 + \frac{1}{6} \ln 2 - \frac{3}{4} \ln 3 + \frac{5}{4} \ln 2 \\
 &= \frac{17}{12} \ln 2 - \frac{13}{16} \ln 3
 \end{aligned}$$

**تصحيح التمرين 10:**

(1) لنحسب  $\int_0^1 x e^x dx$  :

$$\begin{cases} h'(x) = e^x \\ g(x) = x \end{cases} \swarrow \begin{cases} h(x) = e^x \\ g'(x) = 1 \end{cases} \Downarrow$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^x dx &= [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= [x e^x]_0^1 - [e^x]_0^1 \\ &= (e - 0) - (e - 1) = 1 \end{aligned}$$

(2) لنحسب  $\int_0^1 x^2 e^x dx$  :

$$\begin{cases} U'(x) = e^x \\ V(x) = x^2 \end{cases} \swarrow \begin{cases} U(x) = e^x \\ V'(x) = 2x \end{cases} \Downarrow$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^x dx &= [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx \\ &= [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx \\ &= e - 2 \int_0^1 x e^x dx \end{aligned}$$

ومنه:  $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$

(3)

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 |f(x)| dx \times \|i\| \times \|j\| \\ &= \int_0^1 (x^2 + 4x + 4) e^x dx \times 1,5cm \times 2cm \quad \left( (x^2 + 4x + 4) e^x = (x + 2)^2 e^x \geq 0 \right) \\ &= \left( \int_0^1 x^2 e^x dx + 4 \int_0^1 x e^x dx + 4 \int_0^1 e^x dx \right) \times 3cm^2 \\ &= (e - 2 + 4 \times 1 + 4 [e^x]_0^1) \times 3cm^2 \\ &= (e + 2 + 4(e - 1)) \times 3cm^2 \\ &= (5e - 2) \times 3cm^2 \\ &= (15e - 6) cm^2 \end{aligned}$$

تصحيح التمرين 11:

(1)

✓ الدالة  $F$  قابلة للاشتقاق على  $]0, +\infty[$

✓ ليكن  $x \in ]0, +\infty[$  :

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left( \frac{-\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right), \\ &= -\left( \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \right), \\ &= -\left( \frac{\ln'(x) \times x - \ln(x) \times (x)'}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) \\ &= -\frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \\ &= -\frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \\ &= -\frac{1 - \ln x - 1}{x^2} = \frac{\ln x}{x^2} \end{aligned}$$

إذن لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$  :

و بتالي الدالة  $F$  دالة أصلية للدالة  $f$  على المجال  $]0, +\infty[$

(2)

$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[ \frac{-\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^4 \\ &= \left( \frac{-\ln 4}{4} - \frac{1}{4} \right) - (0 - 1) \\ &= \frac{3 - \ln 4}{4} \end{aligned}$$

**تصحيح التمرين 12:**

(1) لنبين أن الدالة  $H : x \mapsto x \ln x - x$  دالة أصلية للدالة  $h : x \mapsto \ln x$  على  $]0, +\infty[$   
 ✓ الدالة  $H$  قابلة للإشتقاق على  $]0, +\infty[$   
 ✓ ليكن  $x \in ]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} H'(x) &= (x \ln x - x)' \\ &= (x)' \ln x + x \ln'(x) - 1 \\ &= \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 \\ &= \ln(x) + 1 - 1 \\ &= \ln x \end{aligned}$$

إذن لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$  :  $H'(x) = h(x)$

و منه الدالة  $H : x \mapsto x \ln x - x$  دالة أصلية للدالة  $h : x \mapsto \ln x$  على  $]0, +\infty[$

(2)

$$\begin{aligned} \int_1^2 h(x) dx &= [H(x)]_1^2 \\ &= H(2) - H(1) \\ &= (2 \ln 2 - 2) - (1 \ln 1 - 1) \\ &= 2 \ln 2 - 2 - 0 + 1 \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

$$A = \int_1^2 |h(x)| dx \times \|i\| \times \|j\| \quad (3)$$

على المجال  $[1, 2]$  لدينا :  $h(x) = \ln x \geq 0$

$$A = \int_1^2 h(x) dx \times 2cm \times 2cm \quad \text{إذن :}$$

$$A = (2 \ln 2 - 1) \times 4cm^2 \quad \text{إذن :}$$

$$A = (8 \ln 2 - 4)cm^2 \quad \text{و منه :}$$

**تصحيح التمرين 13:**

لنحسب :  $\int_2^4 |\ln(x) - 1| dx$

$x$	0	$e$	$+\infty$
$\ln(x) - 1$	-	0	+

$$\begin{aligned}
 \int_2^4 |\ln x - 1| dx &= \int_2^e |\ln x - 1| dx + \int_e^4 |\ln x - 1| dx \\
 &= \int_2^e (1 - \ln x) dx + \int_e^4 (\ln x - 1) dx \\
 &= [x - (x \ln x - x)]_2^e + [(x \ln x - x) - x]_e^4 \\
 &= [2x - x \ln x]_2^e + [x \ln x - 2x]_e^4 \\
 &= 2e - 12 + 10 \ln 2
 \end{aligned}$$

(انظر التمرين 12 لدينا الدالة  $H : x \mapsto x \ln x - x$  دالة أصلية للدالة  $h : x \mapsto \ln x$  على  $]0, +\infty[$ )

### تصحيح التمرين 14:

(1)

• لنحسب :  $A = \int_1^2 (x^3 - 2x + 3) dx$

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^2 (x^3 - 2x + 3) dx \\
 &= \left[ \frac{x^4}{4} - x^2 + 3x \right]_1^2 \\
 &= (4 - 4 + 6) - \left( \frac{1}{4} - 1 + 3 \right) \\
 &= \frac{15}{4}
 \end{aligned}$$

• لنحسب :  $B = \int_0^1 x (x^2 + 1)^2 dx$

$$\begin{aligned}
 B &= \int_0^1 x (x^2 + 1)^2 dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 2x (x^2 + 1) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 + 1)' (x^2 + 1) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[ \frac{(x^2 + 1)^3}{3} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) \\
 &= \frac{7}{6}
 \end{aligned}$$

• لنحسب :  $C = \int_0^2 \frac{1}{x+1} dx$

$$\begin{aligned}
 C &= \int_0^2 \frac{1}{x+1} dx \\
 &= \int_0^2 \frac{(x+1)'}{x+1} dx \\
 &= [\ln|x+1|]_0^2 \\
 &= \ln 3 - \ln 1 \\
 &= \ln 3
 \end{aligned}$$

$$D = \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{|\ln x|}{x} dx \quad \text{نحسب : (2)}$$

$x$	0	$1 + \infty$
$\ln(x)$	-	+

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{|\ln x|}{x} dx &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{|\ln x|}{x} dx + \int_1^e \frac{|\ln x|}{x} dx \\
 &= \int_{\frac{1}{e}}^1 -\frac{1}{x} \ln x dx + \int_1^e \frac{1}{x} \ln x dx \\
 &= -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln' x \ln x dx + \int_1^e \ln' x \ln x dx \\
 &= -\left[ \frac{\ln^2 x}{2} \right]_{\frac{1}{e}}^1 + \left[ \frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^e \\
 &= -\left( 0 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - 0 \right) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

(3)

(i) ليكن  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$\begin{aligned}
 x - 1 + \frac{1}{x+1} &= \frac{(x-1)(x+1)+1}{x+1} \\
 &= \frac{x^2 - 1 + 1}{x+1} \\
 &= \frac{x^2}{x+1}
 \end{aligned}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}) : \frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1} \quad \text{إذن :}$$

$$E = \int_0^2 \frac{x^2}{x+1} dx \quad \text{نحسب (ب)}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^2 \frac{x^2}{x+1} dx \\
 &= \int_0^2 \left( x - 1 + \frac{1}{x+1} \right) dx \\
 &= \int_0^2 \left( x - 1 + \frac{(x+1)'}{x+1} \right) dx \\
 &= \left[ \frac{x^2}{2} - x + \ln|x+1| \right]_0^2 \\
 &= \ln 3
 \end{aligned}$$

(ج) لنحسب :  $F = \int_0^2 x \ln(x+1) dx$

$$\begin{cases} U'(x) = x \\ V(x) = \ln(x+1) \end{cases} \quad \swarrow \quad \begin{cases} U(x) = \frac{x^2}{2} \\ V'(x) = \frac{1}{x+1} \end{cases} \quad \updownarrow$$

$$\begin{aligned}
 F &= \int_0^2 x \ln(x+1) dx \\
 &= \left[ \frac{x^2}{2} \ln(x+1) \right]_0^2 - \int_0^2 \frac{x^2}{2(x+1)} dx \\
 &= (2 \ln 3 - 0) - \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x^2}{x+1} dx \\
 &= 2 \ln 3 - \frac{1}{2} E \\
 &= 2 \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 3 = \frac{3}{2} \ln 3
 \end{aligned}$$