

سلسلة 1	المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى و النظمات	الجزء المشترك العلمي والเทคโนโลยجي
		<u>تمرين 1</u> : حل في $IR$ المعادلات :
	$ x+3  =  2x-1 $ ، $ x-3  = 4$ ، $\sqrt{2}x+5 = \sqrt{2}$ ، $\frac{x-1}{2} - \frac{2x-3}{4} = 3$ ، $2-x = -7x+14$ $\sqrt{x^2 + 7} = 4$ ، $x^3 - 8 + 2x(x-2) = 0$ ، $x(x-2) + 3(x-2) = 0$	
		<u>تمرين 2</u> : حل في $IR$ المتراجحات و النظمات التالية :
	$ 2x-3  \geq 1$ ، $ x-1  \leq \frac{1}{2}$ ، $\sqrt{2}x-5 < \sqrt{3}x-4$ ، $-2x+1 \geq x-3$ ، $5x-1 \leq 3x+11$ $\begin{cases} x \leq 8-3x \\ 2x > x+7 \end{cases}$ ، $\begin{cases} \frac{x-3}{2} \leq 1 \\ x-6 \leq 2(x-3) \end{cases}$ ، $\begin{cases} 2x-3 > 2-3x \\ 5x-3 \leq x+9 \end{cases}$	
		<u>تمرين 3</u> : حل في $IR$ المتراجحات :
	$(2x+1)^2 \leq (x+3)^2$ ، $4x^2 - 9 < 0$ ، $(5x-1)(3x+6) > 0$ ، $(2x-3)(4-x) \geq 0$	
		<u>تمرين 4</u> :
	1) حل في $IR^2$ المعادلات : $-5x + \sqrt{8}y + 2 = 0$ ، $x + 7y - 16 = 0$ ، $5x + y = 3$ 2) من بين المعادلات السابقة ما هي المعادلة التي يكون الزوج $5,3$ - حل	
		<u>تمرين 5</u> : مزيدا من التفكير ..
		حل في $IR$ المتراجحة : 4   2

سلسلة 1	المعادلات والمتراجعات من الدرجة الأولى و النظمات حلول مقترحة	الجذع المشترك العلمي والتكنولوجي
$\frac{x-1}{2} - \frac{2x-3}{4} = 3$ $\frac{2(x-1)}{4} - \frac{(2x-3)}{4} = \frac{12}{4}$ <p><math>S = \emptyset</math> : لدينا : <math>2(x-1) - (2x-3) = 12</math></p> $2x - 2 - 2x + 3 = 12$ $1 = 12$	$2 - x = -7x + 14$ $-x + 7x = -2 + 14$ <p><math>S = \{2\}</math> : وبالتالي : <math>6x = 12</math></p> $x = \frac{12}{6}$ $x = 2$	<b>تمرين 1 :</b>
$ x-3  = 4$ <p>لدينا : <math>x-3 = 4</math> أو <math>x-3 = -4</math></p> $x-3 = 4$ $x = 4+3$ $x = 7$ <p>لدينا : <math>x-3 = -4</math> أو <math>x-3 = 4</math></p> $x-3 = -4$ $x = 4-3$ $x = -1$ <p><math>S = \{7, -1\}</math> : وبالتالي :</p>	$x = \frac{2-5\sqrt{2}}{2}$ <p>لدينا : <math>x = \frac{\sqrt{2}-5}{\sqrt{2}}</math></p> $x = \frac{2-5\sqrt{2}}{2}$	$\sqrt{2}x + 5 = \sqrt{2}$ $\sqrt{2}x = \sqrt{2} - 5$ <p>لدينا : <math>x = \frac{\sqrt{2}-5}{\sqrt{2}}</math></p>
$x(x-2) + 3(x-2) = 0$ <p>لدينا : <math>(x-2)(x+3) = 0</math></p> $x-2 = 0$ <p>منه : <math>x+3 = 0</math> أو <math>x-2 = 0</math></p> $x = 2$ <p>منه : <math>x = -3</math> أو <math>x = 2</math></p> <p><math>S = \{2, -3\}</math> : وبالتالي :</p>	$x+3 =  2x-1 $ $x+3 = -(2x-1)$ <p>منه : <math>x+3 = 2x-1</math> أو <math>x+3 = -2x+1</math></p> $x-2x = -1-3$ $-x = -4$ $x = 4$ <p>منه : <math>3x = -2</math> أو <math>x = 4</math></p> $x = \frac{-2}{3}$ <p>منه : <math>x = 4</math> أو <math>x = \frac{-2}{3}</math></p> <p><math>S = \left\{4, \frac{-2}{3}\right\}</math> : وبالتالي :</p>	$x+3 =  2x-1 $ $x+3 = -(2x-1)$ <p>منه : <math>x+3 = 2x-1</math> أو <math>x+3 = -2x+1</math></p> $x-2x = -1-3$ $-x = -4$ $x = 4$ <p>منه : <math>3x = -2</math> أو <math>x = 4</math></p> $x = \frac{-2}{3}$ <p>منه : <math>x = 4</math> أو <math>x = \frac{-2}{3}</math></p>
$\sqrt{x^2 + 7} = 4$ <p>لدينا : <math>x^2 + 7 = 16</math></p> $x^2 = 16 - 7$ <p>منه : <math>x^2 = 9</math></p> $x = 3$ <p>منه : <math>x = -3</math> أو <math>x = 3</math></p> <p><math>S = \{3, -3\}</math> : وبالتالي :</p>	$(x-2)(x^2 + 2x + 2^2) + 2x(x-2) = 0$ $(x-2)(x^2 + 2x + 4 + 2x) = 0$ $(x-2)(x^2 + 4x + 4) = 0$ $(x-2)(x+2)^2 = 0$ $x-2 = 0$ <p>منه : <math>x+2 = 0</math> أو <math>x-2 = 0</math></p> $x = 2$ <p>منه : <math>x = -2</math> أو <math>x = 2</math></p> <p><math>S = \{2, -2\}</math> : وبالتالي :</p>	$x^3 - 8 + 2x(x-2) = 0$ $x^3 - 2^2 + 2x(x-2) = 0$ $(x-2)(x^2 + 2x + 2^2) + 2x(x-2) = 0$ $(x-2)(x^2 + 2x + 4 + 2x) = 0$ $(x-2)(x^2 + 4x + 4) = 0$ $(x-2)(x+2)^2 = 0$ $x-2 = 0$ <p>منه : <math>x+2 = 0</math> أو <math>x-2 = 0</math></p> $x = 2$ <p>منه : <math>x = -2</math> أو <math>x = 2</math></p>
$x = -y$ أو $x = y$ تعني : $ x  =  y $ و $x = r$ أو $x = -r$ حيث $r > 0$ $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$ تعني : $x = \sqrt[r]{r}$ و $x^2 = r$ و	<p>نذكر بالقواعد : <math> x  = r</math> تعني : <math>x = r</math> أو <math>x = -r</math> حيث <math>r &gt; 0</math></p>	
<p><b>تمرين 2 :</b> حل في <math>IR</math> المتراجعات و النظمات التالية :</p> <p>لدينا : <math>5x-1 \leq 3x+11</math> منه : <math>2x \leq 12</math> منه : <math>x \leq 6</math> منه : <math>x \leq \frac{12}{2}</math></p>		

$$S = \left[ -\infty, \frac{4}{3} \right] : \text{لدينا: } x \leq \frac{4}{3} \text{ منه: } 3x \leq 4 \text{ منه: } -3x \geq -4 \text{ منه: } -2x - x \geq -3 - 1 \text{ منه: } -2x + 1 \geq x - 3$$

$$\text{لدينا: } (\sqrt{3} - \sqrt{2})x > -1 \text{ منه: } (\sqrt{2} - \sqrt{3})x < 1 \text{ منه: } \sqrt{2}x - \sqrt{3}x < -4 + 5 \text{ منه: } \sqrt{2}x - 5 < \sqrt{3}x - 4$$

$$S = \left[ -(\sqrt{3} + \sqrt{2}), +\infty \right] : \text{أي: } x > -(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \text{ منه: } x > \frac{-1(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{3 - 2} \text{ منه: } x > \frac{-1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

لاحظ أن  $\sqrt{3} - \sqrt{2}$  عدد سالب و مقتله هو  $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

$$S = \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right] : \text{لدينا: } \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2} \text{ منه: } \frac{-1}{2} + 1 \leq x \leq \frac{1}{2} + 1 \text{ منه: } \frac{-1}{2} \leq x - 1 \leq \frac{1}{2} \text{ منه: } |x - 1| \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{لدينا: } |2x - 3| \geq 1 \text{ منه: } 2x - 3 \leq -1 \text{ أو } 2x - 3 \geq 1$$

$$S = ]-\infty; 1] \cup [2; +\infty] : \text{لدينا: } |2x - 3| \geq 1$$

$$S = ]1, 3] : \text{لدينا: } 1 < x \leq 3 \text{ يعني: } \begin{cases} x > 1 \\ x \leq 3 \end{cases} \text{ يعني: } 5x > 5 \text{ يعني: } \begin{cases} 5x > 5 \\ 4x \leq 12 \end{cases} \text{ يعني: } 2x - 3 > 2 - 3x \text{ يعني: } 5x - 3 \leq x + 9$$

$$0 \leq x \leq 5 \text{ يعني: } \begin{cases} x \leq 5 \\ x \geq 0 \end{cases} \text{ يعني: } \begin{cases} x \leq 5 \\ -x \leq 0 \end{cases} \text{ يعني: } \begin{cases} x - 3 \leq 2 \\ x - 6 \leq 2x - 6 \end{cases} \text{ يعني: } \begin{cases} \frac{x-3}{2} \leq 1 \\ x - 6 \leq 2(x-3) \end{cases} \text{ يعني: } S = [0; 5]$$

$$S = \emptyset : \text{لدينا: } 7 < x \leq 2 \text{ يعني: } \begin{cases} x \leq 2 \\ x > 7 \end{cases} \text{ يعني: } \begin{cases} x \leq 8 - 3x \\ 2x > x + 7 \end{cases}$$

### تمرين 3:

نحل في  $IR$  المتراجحة:  $(2x-3)(4-x) \geq 0$

$$\text{لدينا: } 2x - 3 = 0 \text{ يعني: } x = 4 \quad 4 - x = 0 \text{ يعني: } x = \frac{3}{2}$$

منه جدول إشارات الحدودية:  $(2x-3)(4-x)$  هو:

$x$	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	4	$+\infty$
$2x - 3$	-	0	+	+
$4 - x$	+	+	0	-
$(2x-3)(4-x)$	-	0	+	-

$$S = \left[ \frac{3}{2}; 4 \right] : \text{لدينا: } (2x-3)(4-x) \geq 0$$

للذكرى، لتحديد إشارة حدانية:  $ax + b$ ، نبحث أولاً عن جذرها أي نحل المعادلة:  $ax + b = 0$ ، فتكون لها نفس إشارة  $a$

يمين الجذر و عكس إشارة  $a$  يساره.

لاحظ أن:  $4 - x = -x + 4 < 0$  أي أن:  $x = 4$

نحل في  $IR$  المتراجحة:  $(5x-1)(3x+6) > 0$

$$\text{لدينا: } 5x - 1 = 0 \text{ يعني: } x = \frac{1}{5} \quad 3x + 6 = 0 \text{ يعني: } x = -2$$

$x$	$-\infty$	$-2$	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
$5x-1$	-	-	0	+
$3x+6$	-	0	+	+
$(5x-1)(3x+6)$	+	0	-	+

$$S = \left] -\infty; -2 \right[ \cup \left] \frac{1}{5}; +\infty \right[$$

وبالتالي حل المتراجحة:  $(5x-1)(3x+6) > 0$  هو:

لنحل في  $IR$  المتراجحة:  $(2x+3)(2x-3) < 0$  أي:  $4x^2 - 9 < 0$

لدينا:  $2x+3=0$  تعني:  $x = -\frac{3}{2}$  و  $2x-3=0$  تعني:  $x = \frac{3}{2}$  منه جدول إشارات الحدودية:

$x$	$-\infty$	$\frac{-3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$2x-3$	-	-	0	+
$2x+3$	-	0	+	+
$4x^2 - 9$	+	0	-	0

$$S = \left[ \frac{-3}{2}; \frac{3}{2} \right]$$

وبالتالي حل المتراجحة:  $4x^2 - 9 < 0$  هو:

لنحل في  $IR$  المتراجحة:  $(2x+1)^2 \leq (x+3)^2$

لدينا:  $[(2x+1)-(x+3)][(2x+1)+(x+3)] \leq 0$  تعني:  $(2x+1)^2 - (x+3)^2 \leq 0$   $(2x+1)^2 \leq (x+3)^2$

تعني:  $x = \frac{-4}{3}$  ، ولدينا:  $3x+4=0$  تعني:  $x = -\frac{4}{3}$  و  $x=2=0$  تعني:  $x = 2$  منه جدول إشارات الحدودية:

$(x-2)(3x+4) \leq 0$  هو:

$x$	$-\infty$	$\frac{-4}{3}$	2	$+\infty$
$x-2$	-	-	0	+
$3x+4$	-	0	+	+
$(x-2)(3x+4)$	+	0	-	0

$$S = \left[ \frac{-4}{3}; 2 \right]$$

وبالتالي حل المتراجحة:  $(2x+1)^2 \leq (x+3)^2$  هو:

إيجاد الجدول لا يعني نهاية الحل، بل يجب الرجوع للمتراجحة لتحديد المجال المناسب، فالكتابية  $0 \leq \dots$  تعني البحث عن المجال الذي تكون فيه الحدودية سالبة و الحالة الأخرى عندما تكون موجبة.

يمكنك البدء في الجدول بأي حدانية من حدانيتي الجناء

لحل متراجحة ليست من الدرجة الأولى يجب دائمًا جعل إحدى الطرفين منعدما و تعميل الطرف الآخر مثل المتراجحة أعلاه.

تمرين 4 :

لنحل في  $IR^2$  المعادلة:  $5x+y=3$  1

$$S = \{ x \in IR / y = -5x + 3 \}$$

لدينا:  $5x + y = 3$  تعني:  $y = -5x + 3$  وبالتالي:

$$x + 7y - 16 = 0$$

$$S = \{ x \in IR / x = -7y + 16 \}$$

لدينا:  $x + 7y - 16 = 0$  تعني:  $x = -7y + 16$  وبالتالي:

$$-5x + \sqrt{8}y + 2 = 0$$

$$x = \frac{\sqrt{8}}{5}y + \frac{2}{5}$$

$$S = \left\{ x \in IR / x = \frac{\sqrt{8}}{5}y + \frac{2}{5} \right\}$$

إيجاد الحلول مثل هذه المعادلات يعني لا يجاد أحد المجهولين بدالة الآخر، ويمكنك الاختيار، لكن يستحسن اختيار الحالات التي تتجنب من خلالها الكسر مثل المثالين الأولين، أما المثال الثالث فحاولنا اختيار الحالة التي لا يكون فيها الجذر المربع في المقام

2

الحلول هي عبارة عن مجموعة أزواج غير منتهية، لذلك يتم التعبير عنها باستعمال الكتابة بادراك وليس بتفصيل.

### تمرين 5 : - مزيداً من التفكير -

$$( |x+2| \leq 3 \text{ تعني: } |x+2| \leq 4 \text{ و } |x+2| \geq 3 )$$

$$\text{تعني: } (x+2 \leq 4 - 4 \leq x+2 \leq 4 \text{ و } x+2 \geq 3 \text{ أو } x+2 \leq -3)$$

$$\text{تعني: } (x \leq -5 \text{ أو } x \geq 1 \text{ و } -6 \leq x \leq -5)$$

$$\text{تعني: } x \in [-6; 2] \cap (-\infty; -5] \cup [1; +\infty)$$

$$\text{تعني: } x \in [-6; -5] \cup [1; 2]$$

$$\text{بالتالي: } S = [-6; -5] \cup [1; 2]$$

أثناء الانتقال لتحديد مجال: «الواو» تصبح تقاطعاً و «أو» تصبح اتحاداً