

← نهايات الدوال و مقلوبياتها: $x \mapsto \sqrt{x}$ و $(n \in \mathbb{N}^*) x \mapsto x^n$

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} \sqrt{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$

إذا كان n عدداً فردياً فإن:	إذا كان n عدداً زوجياً فإن:
$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$
$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} \frac{1}{x^n} = +\infty$	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} \frac{1}{x^n} = +\infty$
$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ <}} \frac{1}{x^n} = -\infty$	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ <}} \frac{1}{x^n} = +\infty$

← نهايات الدوال الدودية و الدوال الجذرية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$:

نهاية دالة جذرية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$
هي نهاية خارج حدتها الأكبر درجة

نهاية حدودية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$
هي نهاية حدتها الأكبر درجة

← نهايات الدوال المثلثية:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
---	---	---

← نهايات الدوال من النوع: $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u(x)}$	$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)$
$\sqrt{\ell}$	$\ell \geq 0$
$+\infty$	$+\infty$

هذه النهايات تبقى صحيحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

→ النهايات والثوابت:

$$\left. \begin{array}{l} u(x) \leq f(x) \leq V(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \ell \\ \lim_{x \rightarrow x_0} V(x) = \ell \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

$$\left. \begin{array}{l} |f(x) - \ell| \leq V(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} V(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

$$\left. \begin{array}{l} u(x) \leq V(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} V(x) = -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} u(x) \leq f(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

→ العمليات على النهايات:

نهاية مجموع دالتين:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	ℓ	ℓ	ℓ	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	ℓ'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) + f(x)]$	$\ell + \ell'$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	شغ

نهاية جداء دالتين:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	ℓ	$\ell < 0$	$\ell > 0$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	ℓ'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) \times f(x)]$	$\ell \times \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	شغ

نهاية خارج دالتين:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	ℓ	ℓ	$\ell < 0$	$\ell > 0$	$-\infty$	$+\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	0^-	0^+	0^-	0^+	0^-	0^+
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	شغ

ملاحظة عامة:

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

← الانصهار في نقطة:

$$x_0 \text{ متصلة في } f \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

نعرف:

→ الانصهار على اليمين - الانصهار على اليسار:

$$x_0 \text{ متصلة على اليمين في } f \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ >}} f(x) = f(x_0) \quad \bullet$$

$$x_0 \text{ متصلة على اليسار في } f \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ <}} f(x) = f(x_0) \quad \bullet$$

$$f \text{ متصلة على اليمين و على اليسار في } x_0 \Leftrightarrow f \text{ متصلة في } x_0$$

← الانصهار على مجال:

 تكون f دالة متصلة على مجال مفتوح $[a, b]$ إذا كانت f متصلة في كل عنصر من المجال $[a, b]$ تكون f دالة متصلة على مجال مغلق $[a, b]$ إذا كانت f متصلة على المجال المفتوح و متصلة على اليمين في a و متصلة على اليسار في b

← العمليات على الدوال اطنصلة:

لتكن f و g دالتين متصلتين على مجال I و k عدد حقيقي• الدوال $f + g$ و $f \times g$ و kf متصلة على المجال I • إذا كانت g لا تندم على I فإن الدالتين $\frac{f}{g}$ و $\frac{1}{g}$ متصلتين على المجال I • كل دالة حدودية متصلة على \mathbb{R} نتائج:

• كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها

• الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ متصلة على \mathbb{R}^+ • الدالتان $x \mapsto \cos x$ و $x \mapsto \sin x$ متصلتان على \mathbb{R} • الدالة $x \mapsto \tan x$ متصلة على مجموعة تعريفها $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

← انصهار مركب الدالن:

إذا كانت f دالة متصلة على مجال I و g متصلة على مجال J بحيث:فإن: gof متصلة على المجال I

← صورة مجال بدالة متصلة:

• صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة

• صورة مجال بدالة متصلة هي مجال

دالان خاصة: لتكن f دالة متصلة و رتبة قطعا على مجال I الجدول التالي يوضح طبيعة المجال $f(I)$

المجال	$f(I)$	المجال
I تناقصية قطعا على f	I تزايدية قطعا على f	I
$[f(b); f(a)]$	$[f(a); f(b)]$	$[a, b]$
$\left[\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); f(a) \right]$	$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right]$	$[a, b[$
$\left[f(b); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); f(b) \right]$	$]a, b]$
$\left[\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right]$	$]a, b[$
$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(a) \right]$	$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]$	$[a, +\infty[$
$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]$	$]a, +\infty[$
$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); f(a) \right]$	$]-\infty, a]$
$\left[\lim_{x \rightarrow a^-} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \right]$	$]-\infty, a[$
$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]$	\mathbb{R}

← معرفة القيم الوسيطية:

إذا كانت f متصلة على مجال $[a, b]$ فإنه لكل عدد حقيقي β محصور بين العددين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل عدد حقيقي α من المجال $[a, b]$ بحيث:

نتيجة:

إذا كانت f متصلة على مجال $[a, b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$

فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الأقل حلًا α ينتمي إلى المجال $[a, b]$

إذا كانت f دالة متصلة و رتبية قطعا على مجال $[a, b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$

فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا واحدًا ينتمي إلى المجال $[a, b]$

← طريقة النفرع الثنائي:

لتكن f دالة متصلة و رتبية قطعا على مجال $[a, b]$ بحيث:

ولتكن α الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $[a, b]$

إذا كان: $f(b) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$

فإن: $\frac{b-a}{2} < \frac{a+b}{2} < \alpha < b$ و هذا التأثير سعته

يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left[\frac{a+b}{2}; b\right]$ للحصول

على تأثير أدق للعدد α

إذا كان: $f(a) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$

فإن: $\frac{b-a}{2} < \alpha < \frac{a+b}{2}$ و هذا التأثير سعته

يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left[a; \frac{a+b}{2}\right]$ للحصول

على تأثير أدق للعدد α

ملاحظة: وهذا دواليك يمكن إعادة هذه الطريقة إلى أن يتم الحصول على تأثير للعدد α سعته مرغوب فيها