

يعتبر جرب **السنخ Galle du Collet** مرضًا يصيب العديد من النباتات، ويتمثل في تكاثر الخلايا مكونةً ورما على مستوى نقطة التحام الجذر بالسايق. ونظراً للآثار التي يخلفها هذا لسرطان على المستوى الاقتصادي، تم الاهتمام به والقيام بالعديد من التجارب.

- التجربة الأولى: قام الباحثان: سميت E.SMITH و تاونسند C.TOWNSEND (سنة 1907) بعزل بكتيريا *Agrobactérium tumefaciens* من إحدى الأورام، ثم لقحها بها نبات آخر سليماً، ظهر بهذا الأخير ورما سرطاني.

1- ماذا يمكنك استنتاجه من هذه التجربة؟

* التجربة الثانية: في سنة 1942، نجح الباحث برون A.BRAUN في زراعة نسيج جرب السنخ Galle du Collet (بدون بكتيريا) في وسط يتكون خاصةً من السكروز والأملاح المعدنية. فتكاثرت خلايا النسيج بطريقة فوضوية، عكس الخلايا العادبة التي تتکاثر ببطءٍ، متطلبة توافد هرمونات نباتية.

2- ما التغيير الذي حدث لخلايا العنفج Collet، بوجود هذه البكتيريا؟

3- ما الفرضية التي يمكنك اقتراحها حول هذا التغيير الحاصل في سلوك الخلايا النباتية؟


- اكتشفت جماعة من الباحثين وجود نوعين من البكتيريا *Agrobactérium tumefaciens*، A و B وكلاهما ممرض Pathogène (يحدث تشكيل الورم).

* النوع A: يؤدي إلى تشكيل ورم، تقوم خلاياه بتركيب النوباليين Nopaline.

* النوع B: يؤدي إلى تشكيل ورم، تقوم خلاياه بتركيب الأوكوبين Octopine.

4- ما الفرضيات الإضافية التي يمكنكم طرحها في ما يخص التغيير الحاصل في سلوك الخلايا المعنية بالأمر؟

* التجربة الثالثة: نزرع في درجة حرارة 37°C سلالة من بكتيريا *Agrobactérium tumefaciens*، نوع A حساسة للتغيرات درجات الحرارة. ونحصل على سلالة A و تمثل الوثيقة 1 بقية التجربة.




5- حل النتائج المحصل عليها.

* التجربة الرابعة: لتوضيح دور البلاسميد (حلقة صغيرة من ADN تحمل مورثات إضافية، قمنا بتجربة أخرى: حشونا نبتة سليمة ببكتيريا A (غير ممرضة non pathogènes ومقاومة للمضادات الحيوية)، وببكتيريا B (ممرضة Pathogènes وحساسة للمضادات الحيوية)، فشكل ورم على مستوى عنق Collet النبتة (انظر الوثيقة 2، الجزء العلوي):

6- ما التفسير الذي يمكنك تقديمها لنتيجة هذه التجربة؟

بعد سحق الورم، تم تمديده على سطح وسط زرع يحتوي على مضادات حيوية، والنتيجة مماثلة بالوثيقة 2، الجزء السفلي.

7- تعرف على البكتيريا: 1، 2 و3 المحصل عليها.



2 | الوثيقة



3 | الوثيقة

10- من خلال نتائج التجارب السابقة، وباعتمادك على الوثيقة 3، اشرح كيف يتكون الورم على مستوى عنق Collet النبتة؟

- 1- البكتيريا *Agrobacterium-tumefaciens* هي العامل المسؤول عن تكاثر الخلايا المسببة لمرض السنخ عند النباتات.
- 2- تحول الخلايا النباتية إلى خلايا سرطانية حيث تصبح قادرة على التكاثر العشوائي ولو في غياب الهرمونات النباتية.
- 3- نقلت البكتيريا إلى الخلايا النباتية مادة ترغمهها على التكاثر العشوائي ولو في غياب الهرمونات النباتية المسببة لهذا التكاثر.
- 4- المادة المنقولة هي قطعة من ADN البكتيريا تتضمن مورثة أو مورثات مسؤولة عن تركيب النوباليين في حالة كون البكتيريا من النوع A أو مسؤولة عن تركيب الأوكتوبين في حالة كون البكتيريا من نوع B.
- 5- ينتج عن زراعة سلالة البكتيريا A الممرضة والحساسة لتغيرات درجات الحرارة في وسط درجة حرارته 37°C فقدانها لبلاسميدي النوباليين وقدرتها الممرضة حيث لا يؤدي حقنها إلى ظهور الورم عند النبتة المحقونة. القدرة الممرضة للبكتيريا ترتبط بوجود بلسميدتها للنوباليين.
- 6- يدل ظهور المرض على أن الخلايا النباتية أدخلت البكتيريا B المتضمنة لبلاسميدي للأكتوبين الممرض، ولأن البكتيريا A غير قادرة على إحداث المرض لعدم توفرها على البلاسميد الممرض.
- 7- البكتيريا 1 لا تحتوي على أي بلاسميد ومقاومة للمضادات الحيوية فهي، إذن البكتيريا A (السلالة A).
- البكتيريا 3 تملك بلاسميديا للأكتوبين وحساسة للمضادات الحيوية، فهي إذن البكتيريا B (السلالة B).
- البكتيريا 2 تملك بلاسميديا للأكتوبين ومقاومة للمضادات الحيوية وبذلك فإنها تختلف عن البكتيريا A والبكتيريا B لكنها تجمع بين خصائصهما، فهي إذن نوع جديد من البكتيريات.
- 8- يتكون البلاسميد من ال ADN وسيق الكشف عن أن مورثات البلاسميد هي المسؤولة عن الحدة الممرضة للبكتيريا. بانتقال البلاسميد من البكتيريا B الممرضة إلى البكتيريا A من لهذه الأخيرة القدرة على إحداث المرض بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة المضادات الحيوية إذن البلاسميد لعب دور ناقل المورثات المسؤولة عن إحداث المرض عند النبات من البكتيريا B إلى البكتيريا A.
- 9- يمكن استعمال بلasmيدات البكتيريات لنقل مورثات مسؤولة عن صفات مرغوب فيها، بعد إدماجها في البلasmيدات، إلى نباتات مزروعة، وبالتالي تعديل الذريحة الوراثية لهذه النباتات، وذلك لتحسين مردوديتها مثلاً.
- 10- تتسرب البكتيريات الممرضة، الموجودة في التربة، إلى نسيج النبات ثم إلى خلاياه، عبر جرح على مستوى عنيق النبات، تدمج مورثات بلاسميد البكتيريا في ADN الخلية النباتية فتحدث فيها تغيراً وراثياً يحولها إلى خلية نباتية سرطانية تتكاثر عشوائياً لتحدث الورم.