

# الأعداد العقدية

## 1. تقديم و تعاريف :

- ❖ توجد مجموعة يرمز لها ب  $\mathbb{C}$  و تسمى مجموعة الأعداد العقدية و تتحقق  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  و هي تحتوي على عدد نرمز له ب  $i$  حيث  $i^2 = -1$
- ❖ كل عدد  $z$  من  $\mathbb{C}$  يكتب على شكل  $z = a + ib$  مع  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$
- ❖ العدد  $a$  يسمى الجزء الحقيقي و نرمز له ب  $\operatorname{Re}(z)$
- ❖ العدد  $b$  يسمى الجزء التخييلي و نرمز له ب  $\operatorname{Im}(z)$
- ❖ الكتابة  $z = a + ib$  مع  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  تسمى الشكل الجبري للعدد العقدي
- ❖ إذا كان  $b \in \mathbb{R}$  حيث  $z = ib$  نقول أن  $z$  تخييلي صرف و نكتب  $z \in i\mathbb{R}$

## 2. خصائص :

ليكن  $(z, z') \in \mathbb{C}^2$  لدينا :

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0 \quad \bullet$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0 \quad \bullet$$

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases} \quad \bullet$$

$$z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 0 \end{cases} \quad \bullet$$

## العمليات في $\mathbb{C}$

ليكن  $z' = a' + ib'$  و  $z = a + ib$

$$z + z' = (a + a') + i(b + b') \quad \bullet$$

$$z \times z' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b) \quad \bullet$$

$$-z = -a - ib \quad \bullet$$

$$\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \quad \bullet$$

جميع خصائص الجداء و الجمع في  $\mathbb{R}$  تبقى صالحة في  $\mathbb{C}$

$$(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi \quad \bullet$$

$$(a - ib)^2 = a^2 - b^2 - 2abi \quad \bullet$$

$$(a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2 \quad \bullet$$

### 3. مراقب عدد عقدي

تعريف:

مراقب العدد العقدي  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  هو العدد العقدي  $z = a + ib$

خصائص المراقب

ليكن  $z_1$  و  $z_2$  عددين عقديين

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \checkmark$$

$$\overline{z_1 \times z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2} \quad \checkmark$$

$$(z_1 \neq 0) \frac{\overline{1}}{z_1} = \frac{1}{\overline{z_1}} \quad \checkmark$$

$$\overline{\left( \frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad \checkmark$$

$$z \in \mathbb{C} \text{ و } n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } \overline{z^n} = \overline{z}^n \quad \checkmark$$

نتائج:

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) \quad \bullet$$

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z) \quad \bullet$$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z} \quad \bullet$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = -\bar{z} \quad \bullet$$

### 4. معيار عدد عقدي :

معيار العدد العقدي  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  هو العدد الحقيقي الموجب الذي نرمز له بـ  $|z|$  و هو معرف بما يلي :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

خصائص:

ليكن  $z$  و  $z'$  عددين عقديين

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} \quad \checkmark$$

$$|z \times z'| = |z| \times |z'| \quad \checkmark$$

$$(z \neq 0) \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} \quad \checkmark$$

$$(z \neq 0) \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad \checkmark$$

$$n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } |z^n| = |z|^n \quad \checkmark$$

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \quad \checkmark$$

### 5. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم :

أ. عمرة عدد عقدي غير منعدم :

ليكن  $z = x + iy$  من  $\mathbb{C}^*$  حيث  $x$  و  $y$  من  $\mathbb{R}$

$(k \in \mathbb{Z}) \quad \arg(z) = \theta + 2k\pi$  يسمى عمرة لـ  $z$  و نكتب :  $\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{y}{|z|} \end{cases}$  كل عدد حقيقي  $\theta$  بحيث :  $(k \in \mathbb{Z}) \quad \arg(z) \equiv \theta [2\pi]$  أو

ب. خصائص العمدة :

ليكن  $z_1$  و  $z_2$  عددين عقديين غير منعدمين

$$\arg(\overline{z_1}) \equiv -\arg(z_1) [2\pi] \quad \checkmark$$

$$\arg(z_1 \times z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi] \quad \checkmark$$

$$\arg\left(\frac{1}{z_1}\right) \equiv -\arg(z_1) [2\pi] \quad \checkmark$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi] \quad \checkmark$$

$$n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } \arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi] \quad \checkmark$$

### 6. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم :

تعريف:

كل عدد عقدي  $z$  غير منعدم يكتب على شكل  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  حيث  $r \equiv |z|$  و  $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$


خصائص الشكل المثلثي:

- $\overline{r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))} = r(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$  •
- $r(\cos \theta + i \sin \theta) \times r'(\cos \theta' + i \sin \theta') = rr'(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta'))$  •
- $\frac{1}{r(\cos \theta + i \sin \theta)} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$  •
- $\frac{r(\cos \theta + i \sin \theta)}{r'(\cos \theta' + i \sin \theta')} = \frac{r}{r'}(\cos(\theta - \theta') + i \sin(\theta - \theta'))$  •
- حيث  $(r(\cos \theta + i \sin \theta))^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$  •


7. تأويلات هندسية للأعداد العقدية:

تعريف:

في المستوى  $(P)$  المنسوب إلى معلم متعمد مننظم  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$   
لتكن النقطة  $M(a, b)$   
 العدد العقدي  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  يسمى لحق النقطة  $M$  •  
 النقطة  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  تسمى صورة العدد  $z = a + ib$  حيث  $a, b \in \mathbb{R}$  •



• مراافق  $\bar{z} = a - ib$  هو  $z = a + ib$



لدينا كذلك  $\overrightarrow{U}(a,b)$  هو لحق المتجهة  $z = a + ib$  •


المستوى  $(P)$  يسمى المستوى العقدي •

$(O, \vec{e}_1)$  يسمى المحور الحقيقي •


$(O, \vec{e}_2)$  يسمى المحور التخييلي •

$$aff(M) = a + ib \quad z_M = a + ib \quad \text{و نكتب} \quad \overrightarrow{OM} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 \quad •$$

❖ ليكن  $z = a + ib$  لحق النقطة  $M$  من المستوى العقدي لدينا :



$$OM = \sqrt{a^2 + b^2} = |z| : OM \text{ المسافة} \diamond$$



المسافة  $: AB$

لتكن  $A$  و  $B$  نقطتان لحقاهما على التوالي  $z_B$  و  $z_A$

لدينا  $: AB = |z_B - z_A|$

خاصيات :

لتكن  $A$  و  $B$  نقطتان لحقاهما على التوالي  $z_B$  و  $z_A$

و  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتان من المستوى العقدي  $(P)$  :

- لـ  $\overline{AB}$  هو  $z_B - z_A$

- لـ  $\overline{u+v}$  هو  $z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$

- لـ  $\overline{I}$  منتصف القطعة  $[AB]$  هو  $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$

- $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow z_{\vec{u}} = z_{\vec{v}}$

- نقطة لدينا  $M$

$$\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{OB} \Leftrightarrow z_M = z_A + z_B$$

$$\overline{OM} = \alpha \overline{OA} \Leftrightarrow z_M = \alpha z_A$$

• لـ  $A(z_A)$  و  $B(z_B)$  و  $C(z_C)$  و  $D(z_D)$  نقط مختلفة مثبمتى

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow C \text{ و } B \text{ و } A \text{ مـستقيمة}$$

$$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (AB) \parallel (DC)$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow$$

$$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow (AB) \perp (DC)$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \frac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow D \text{ و } C \text{ و } B \text{ متـدورـة} \text{ حول } A$$

قياس الزوايا :

لـ  $A(z_A)$  و  $B(z_B)$  و  $C(z_C)$  و  $D(z_D)$  نقط

$$O \neq A \text{ حيث } (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{OA}) \equiv \arg(z_A)[2\pi]$$

$$A \neq B \text{ حيث } (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A)[2\pi]$$

$$A \neq C \text{ و } A \neq B \text{ حيث } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$$

حيث  $C \neq D$  و  $A \neq B$

8. الشكل الأسني لعدد عقدي :

تعريف :

كل عدد عقدي غير منعدم يكتب على شكله الأسني بـ:  $z = re^{i\theta}$   
 $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$  و  $|z| = r$  حيث

خصائص :

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta & \checkmark \\ \overline{e^{i\theta}} &= e^{-i\theta} & \checkmark \\ \frac{1}{e^{i\theta}} &= e^{-i\theta} & \checkmark \\ e^{i\theta} \times e^{i\theta'} &= e^{i(\theta+\theta')} & \checkmark \\ \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} &= e^{i(\theta-\theta')} & \checkmark \\ (e^{i\theta})^n &= e^{in\theta} & \checkmark \end{aligned}$$

صيغ أولية

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{aligned}$$

9. الجذور التنوينية لعدد عقدي غير منعدم

ليكن  $Z$  من  $\mathbb{C}$  و  $n$  من  $\mathbb{N}^* - \{1\}$  ❖

نسمى الجذر النوني للعدد  $Z$  أو الجذر من الرتبة  $n$  للعدد  $Z$  كل عدد عقدي  $z$  يحقق  $z^n = Z$   $\diamond$   
 $(r > 0) \quad Z = re^{i\theta}$

العدد  $Z$  يقبل  $n$  جذر نوني و هذه الجذور النونية تكتب على شكل :  $z_k = \sqrt[n]{re^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}}$  حيث  $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$   $\diamond$

صور الجذور النونية للعدد  $Z$  تكون مصلعاً منتظماً ذو  $n$  ضلع محاطاً بالدائرة التي مركزها  $O$  وشعاعها  $\sqrt[n]{r}$   $\diamond$

الجذور النونية للعدد 1 هي الأعداد :  $w_k = \sqrt[n]{re^{i\frac{2k\pi}{n}}}$  حيث  $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$  و تسمى الجذور من الرتبة  $n$  للوحدة  $\diamond$

ليكن  $Z$  من  $\mathbb{C}^*$  و  $a$  أحد الجذور النونية للعدد  $Z$  نحصل على الجذور النونية للعدد  $Z$  بضرب  $a$  في الجذور النونية للوحدة  $\diamond$

## 10. الجذور المربعة لعدد عقدي غير منعدم

### أ. الطريقة المثلثية :

ليكن  $(r > 0) \quad Z = re^{i\theta}$   
 $-\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$  و  $\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$  هما :

### ب. الطريقة الجبرية :

(1) إذا كان  $Z \in \mathbb{R}_+^*$  :  $\sqrt{Z}$  و  $-\sqrt{Z}$  هما الجذران المربعان للعدد  $Z$

(2) إذا كان  $Z \in \mathbb{R}_-^*$  :  $-i\sqrt{-Z}$  و  $i\sqrt{-Z}$  هما الجذران المربعان للعدد  $Z$

(3) إذا كان  $Z \in i\mathbb{R}_+^*$  :  $Z = ib$  ( $b \in \mathbb{R}_+^*$ )  $Z \in i\mathbb{R}_+^*$   $\diamond$

(4) إذا كان  $Z \in i\mathbb{R}_-^*$  :  $Z = ib$  ( $b \in \mathbb{R}_-^*$ )  $Z \in i\mathbb{R}_-^*$   $\diamond$

(5) إذا كان  $Z = a + ib$  ( $b \neq 0$  و  $a \neq 0$ )  $\diamond$

:  $b > 0$   $\diamond$

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{a^2 + b^2})} + i\sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 + b^2})} \\ & - \sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{a^2 + b^2})} - i\sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 + b^2})} \end{aligned}$$

هـما الجذران المربعان للعدد  $Z$

:  $b < 0$

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{a^2 + b^2})} - i\sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 + b^2})} \\ & - \sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{a^2 + b^2})} + i\sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 + b^2})} \quad \text{و} \\ & \text{هما الجذران المربعيان للعدد } Z \end{aligned}$$

### 11. المعادلات من الدرجة الثانية:

نعتبر المعادلة  $(a \neq 0) \quad az^2 + bz + c = 0$

حل المعادلة  $az^2 + bz + c = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

:  $\Delta = 0$

فإن المعادلة تقبل حلاً وحيداً هو :  $z = \frac{-b}{2a}$

:  $\Delta \neq 0$

فإن  $\Delta$  يقبل جذريين مربعين هما  $\mu$  و  $-\mu$  و يكون للمعادلة حلتين هما :

$$z = \frac{-b + \mu}{2a} \quad \text{أو} \quad z = \frac{-b - \mu}{2a}$$

ملاحظة: إذا كان  $z_1$  و  $z_2$  هما حلّي المعادلة  $az^2 + bz + c = 0$  فإن :

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \\ z_1 \times z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

## 12. التحويلات الاعتيادية :

نعتبر تحويلًا في المستوى يربط كل نقطة  $M'(z)$  بالنقطة  $M(z)$

❖ الكتابة العقدية للإزاحة  $T$  ذات المتجهة  $\bar{u}$  هي :

$z' - \omega = k(z - \omega)$  و نسبته  $k$  هي :

$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$  و زاويته  $\theta$  هي :

نعتبر التطبيق :  $f : \begin{array}{ccc} P & \mapsto & P \\ M(z) & \mapsto & M'(z') \end{array}$

إذا كان  $a = 1$  ►

فإن  $f$  إزاحة متجهتها  $\bar{u}$  ذات اللحق  $b$

إذا كان  $a \in \mathbb{R}^* - \{1\}$  ►

فإن  $f$  تحاكي مركزه  $\Omega$  لحقه  $\frac{b}{1-a}$  و نسبته  $a$

(  $z = az + b$  ) هي النقطة الصامدة بالتحويل  $f$  أي  $\Omega = f(\Omega)$  ويتم تحديد لحقها بحل المعادلة

إذا كان  $|a| = 1$  حيث  $a \in \mathbb{C}^* - \{1\}$  ►

فإن  $f$  دوران مركزه  $\Omega$  لحقه  $\frac{b}{1-a}$  و زاويته  $\arg(a)$

(  $z = az + b$  ) هي النقطة الصامدة بالتحويل  $f$  أي  $\Omega = f(\Omega)$  ويتم تحديد لحقها بحل المعادلة

► إذا كان  $|a| \neq 1$  حيث  $a \in \mathbb{C}^* - \{1\}$

فإن  $f = h \circ r$

حيث :  $h$  هو التحاكي الذي مركزه  $\Omega$  لحقة  $\frac{b}{1-a}$  و نسبته

$\arg(a)$  و زاويته  $\frac{b}{1-a}$  و  $r$  هو الدوران مركزه  $\Omega$  لحقة

### ملاحظات :

- إذا كان  $r$  دوران مركزه  $\Omega$  و زاويته  $\theta$  فإن  $r^{-1}$  هو الدوران العكسي للدوران  $r$  له نفس المركز و زاويته  $-\theta$
- التحاكي الذي نسبته  $1 -$  هو تماثل مركري