

الحساب التكامل

1. تكامل دالة متصلة على مجال:

1. تعريف:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$ و F دالة أصلية لها على $[a,b]$.

تكامل f من a إلى b هو العدد الحقيقي : $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

2. ملاحظات:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b \quad \bullet$$

يمكن تغيير x بأي متغير آخر مثلاً : •

الدالة $F: x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ هي الدالة الأصلية للدالة f التي تتعدم في a •

v قابلة للاشتغال على E بحيث $E \subset I$ فإن الدالة $v(E) \subset I$ و f متصلة على I فإن الدالة $\psi: x \mapsto \int_a^{v(x)} f(t)dt$ قابلة للاشتغال •

$$\psi'(x) = v'(x)f(v(x)) \quad \text{على } E \quad \text{ولدينا :}$$

3. خصائص:

$$\int_a^a f(x)dx = 0 \quad \diamond$$

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx \quad \diamond$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad \diamond$$

4. خطانیة التكامل :

خاصية :

لتكن f و g دالتان متصلتان على المجال $[a,b]$. لدينا :

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$(\alpha \in \mathbb{R}) \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

II. التكامل و الترتيب :

1. خاصية :

لتكن f و g دالتان متصلتان على المجال $[a,b]$. لدينا :

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 \text{ على } [a,b] \text{ فإن } f \geq 0$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq 0 \text{ على } [a,b] \text{ فإن } f \leq 0$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \text{ فإن } f \leq g$$

2. القيمة المتوسطة :

تعريف و خاصية :

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$. العدد $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ يسمى القيمة المتوسطة لـ f على $[a,b]$.

يوجد على الأقل عدد c من $[a,b]$ بحيث :

III. تقييمات حساب التكامل :

A. باستعمال دالة أصلية: سبق الحديث عنها في بداية الدرس

B. باستعمال المتكاملة بالأجزاء:

خاصية:

لتكن u و v دالتان قابلتان للاشتغال على مجال I حيث $'u$ و $'v$ متصلتان على I و a و b عنصرين من I لدينا :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$


C. باستعمال المتكاملة بتغيير المتغير

خاصية وتعريف:

لتكن f دالة متصلة على مجال I و u دالة قابلة للاشتغال على مجال $[\alpha, \beta]$ (بحيث $I \subset [\alpha, \beta]$) لدينا :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(x))u'(x)dx = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(t)dt$$

IV. حساب المساحات :



ليكن المستوى منسوبا إلى معلم متعمد (O, \vec{i}, \vec{j}) وحدة المساحة $u.A$ هي مساحة المستطيل المحدد بالنقطة O والتجهيتين \vec{i} و \vec{j}

$$1.u.A = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$$

خاصية 1:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$ مساحة الحيز المحصور بين (C_f) و محور الأفاسيل و المستقيمين اللذين معادلتها $x=a$ و $x=b$ هي :





$$\left(\int_a^b |f(x)|dx \right) u.A$$

خاصية 2:

لتكن f و g دالتان متصلتان على المجال $[a,b]$ مساحة الحيز المحصور بين (C_g) و (C_f) و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين معادلاتها $x=a$ و $x=b$ هي :

$$\left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) u.A$$

حالات خاصة :

مساحة الحيز الملون في الرسم هي:	ملاحظات	رسم توضيحي
$\left(\int_a^b f(x) dx \right) u.A$	موجبة على المجال $f [a,b]$	
$\left(\int_a^b -f(x) dx \right) u.A$	سالبة على المجال $f [a,b]$	
$\left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b -f(x) dx \right) u.A$	• موجبة على المجال $f [a,c]$ • سالبة على المجال $f [c,b]$	
$\left(\int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right) u.A$	(C_g) يوجد فوق (C_f) على المجال $[a,b]$	

$\left(\int_a^c (f(x) - g(x)) dx + \int_c^b (g(x) - f(x)) dx \right) u.A$	• يوجد فوق (C_f) على (C_g) المجال $[a,c]$ و يوجد تحت (C_f) على (C_g) المجال $[c,b]$	
--	---	--


٧. حساب الحجوم :

خاصية ١:

<p>ليكن (Σ) مجسما محصورا بين المستويين (P_1) و (P_2) اللذين معادلتها على التوالي : $z = b$ و $z = a$.</p> <p>ولتكن (t) مساحة تقاطع المجسم (Σ) مع المستوى الذي معادلته $z = t$ حيث $a \leq t \leq b$.</p> <p>إذا كانت الدالة : $t \mapsto S(t)$ متصلة على المجال $[a,b]$ فلن $V = \int_a^b S(t) dt$ هو حجم المجسم (Σ) بوحدة قياس الحجم.</p>
--

خاصية ٢:

<p>حجم المجسم المولد بدوران (C_f) حول محور الأفاصيل دورة كاملة في مجال $[a,b]$ هو :</p> <p>حيث : $u.v$: وحدة الحجوم</p> $V = \left[\int_a^b \pi(f(x))^2 dx \right] u.v$
--



.VI حساب بعض النهايات باستعمال التكامل :

خاصية

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$

$$(n \in \mathbb{N}^*) \quad S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \quad \text{و} \quad s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \int_a^b f(t) dt \quad \text{لدينا المتتاليتان } (S_n) \text{ و } (s_n) \text{ متقاربتان}$$