تمارين الأقمار الاصطناعية والكواكب

تمرين 1:

يعتبر كوكب زحل الكوكب الذي له أكبر عدد من الاقمار التابعة له.
أكبرالأقمار الخمسون التابعة له هو تيتان . يدور هذا الأخير في مسار دائري شعاعه $r = 1{,}22.10^6 km$
ودوره المداري j $T = 15{,}9$.
1-بين أن حركة تيتان دائرية منتظمة.
2-أثبت تعبير الدور المداري بدلالة G و r و M_S كتلة زحل.
3-أحسب كتلة زحل.
نعطي : ثابتة التجاذب الكوني : $G = 6{,}67.10^{-11}(S.I)$

تمرين 2:

يدور قمر اصطناعي حول الأرض على اتفاع $h = 205\ km$ من سطح الأرض .
كتلة القمر الاصطناعي $m = 87{,}3\ kg$.



أحسب:
1-الدور المداري للقمر الإصطناعي و استنتج تردد دورانه.
2-سرعته .
3-تسارعه المنظمي وتسارعه المماسي واستنتج تسارعه الكلي.
4-شدة القوة المطبقة عليه من طرف الأرض.
نعطي:
شعاع الأرض: $R = 6380\ km$
كتلة الأرض : $M = 5{,}98.10^{24} kg$
ثابتة التجاذب الكوني : $G = 6{,}67\ .\ 10^{-11}(S.I)$

تمرين 3:

تمكن كل من دراسة حركة الأرض حول الشمس ودراسة حركة الأقمار الإصطناعية حول الأرض ، من مقارنة كتلة الشمس (S) ب m كتلة الأرض (T) .



معطيات:
الدور المداري لحركة الأرض حول الشمس : $T_T = 365\ jours$.
شعاع المدار الدائري لحركة مركز الأرض حول الشمس :
$r_T = 1{,}5.10^8\ km$.
دور دوران الأرض حول محورها القطبي : $T_0 = 1jour$.
نعتبر قمرا اصطناعيا (S) ساكنا بالنسبة للأرض ، كتلته m_0 و شعاعه في المعلم المركزي الأرضي هو: $r_0 = 4{,}2.10^4\ km$.
نهمل تأثير باقي الكواكب على كل من الأرض (T) والقمر الإصطناعي (S)
أنظر للشكل.

Moutamadris.ma

1-ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر ليكون قمر إصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض .
2-بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على القمر الإصطناعي (S) في المعلم المركزي الأرضي ، أثبت أن تعبير متجهة تسارع مركز قصور القمر (S) هو : $\vec{a} = \frac{G.m}{{r_0}^2}\vec{n}$ ، حيث G ثابتة التجاذب الكوني ، و $\vec{n}$ النتجهة الواحدية المنظمية لمعلم فريني
3-بين أن حركة القمر الإصطناعي (S) في المعلم المركزي الأرضي ، منتظمة ودائرية .
4-استنتج بدلالة G و m و r_0 ، تعبير الدور المداري T للقمر (S) حول الأرض .
5-يعبر عن القانون الثالث لكيبلير بالعلاقة : $\frac{T^2}{{r_0}^3} = K$ ، أوجد تعبير الثابتة K بدلالة G و m .
6-حدد تعبير النسبة $\frac{M}{m}$ بدلالة r_T و r_0 و T_T و T_0 . أحسب كتلة الأرض علما أن كتلة الشمس تقارب : $M = 2.10^{30}\ kg$

تمرين 4:

يدور حول الأرض مجموعة من الأقمار الإصطناعية في مدارات دائرية وذلك من أجل تقديم مجموعة من الخدمات للإنسان ، كالإتصال ومراقبة أحوال الطقس والحدود الجغرافية .....ومن بين هذه الأقمار نجد أقمارا نقول إنها ساكنة بالنسبة للأرض .
الهدف من هذا التمرين هو دراسة حركة قمر اصطناعي ساكن بالنسبة للأرض تم وضعه في مداره على ارتفاع $h = 36000km$ بالنسبة لسطح الأرض .
معطيات :
ثابتة التجاذب الكوني : $G = 6{,}67.10^{-11}\ (S.I)$
كتلة الأرض : $M_T = 5{,}98.10^{24}\ kg$.
شعاع الأرض : $R_T = 6350\ km$
1-ماهو المعلم الذي نختاره لدارسة هذه الأقمار .
2-ما هي الشروط الواجب توفيرها ليكون القمر اللإصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض .
3-مثل على تبيانة القمر الإصطناعي في مداره حول الأرض ثم بين القوة المطبقة عليه $\vec{F}_{T/S}$ ومتجهة سرعته $\vec{v}$ ومتجهة تسارعه $\vec{a}$.
4-أوجد تعبير سرعة القمر بدلالة G و M_T و R_T و h . أحسب قيمتها .
5-أثبت القانون الثالث لكيبلير .
6-استنتج الدور المداري بالنسبة للأرض ، ماذا يمثل هذا الدور بالنسبة للأرض .

Moutamadris.ma

تصحيح تمارين حركة الأقمار الإصطناعية والكواكب

تمرين 1:



1- نبين أن حركة تيتان دائرية منتظمة:

يخضع تيتان لقوة $\vec{F}_{SLT}$ التجاذب الكوني المطبقة عليه من طرف زحل نعبر عنها بالعلاقة:

$$\vec{F}_{S/T} = -G\frac{m.M_S}{r^2}\vec{u}_{S/T}$$

حيث m كتلة القمر الإصطناعي و M_S كتلة زحل .

نطبق القانون الثاني لنيوتن على تيتان ، في المعلم المركزي لزحل :

$$\vec{F}_{S/T} = m\vec{a}$$

باعتبار المتجهة الواحدية $\vec{n} = -\vec{u}_{ST}$
نكتب متجهة قوة التجاذب :

$$\vec{F}_{S/T} = G\frac{m.M_S}{r^2}\vec{n}$$
$$m\vec{a} = G\frac{m.M_S}{r^2}\vec{n}$$
$$\vec{a} = G\frac{M_S}{r^2}\vec{n}$$

في المعلم فريني $(T,\vec{u},\vec{n})$ لدينا : $\vec{a} = \frac{dV}{dt}\vec{u} + \frac{V^2}{\rho}\vec{n}$

وبالتالي : $\frac{dV}{dt} = 0$ أي : $V = cst$ ومنه الحركة منتظمة

و $G\frac{M_S}{r^2} = \frac{V^2}{\rho}$ باعتبار $\rho = r$ نستنتج : $r = \frac{G.M_S}{V^2} = cst$ إذن الحركة دائرية منتظمة.

2-تعبير الدور المداري:

الدور المداري T لتيتان هو المدة الزمنية التي ينجز فيها القمر دورة واحدة حول المريخ :
لدينا: $V = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{V}$
تعبير السرعة :

Moutamadris.ma

$$G\frac{M_S}{r^2} = \frac{V^2}{r} \Rightarrow V^2 = \frac{GM_S}{r}$$

$$V = \sqrt{\frac{GM_S}{r}}$$

تعبير الدور المداري لتيتان :

$$T = \frac{2\pi r}{V} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM_S}{r}}}$$

نستنتج: $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M_S}}$

3-تحديد كتلة زحل:

العلاقة السابقة تكتب:

$$T^2 = \frac{4\pi^2.r^3}{G.M_S}$$

$$M_S = \frac{4\pi^2}{G}.\frac{r^3}{T^2}$$

ت.ع:

$$M_S = \frac{4\pi^2}{6,67.10^{-11}} \times \frac{(1,22.10^9)^3}{(15,9 \times 24 \times 3600)^2}$$

$$M_S = 5,69.10^{26}kg$$

تمرين 2:

1-الدور المداري واستنتاج التردد:

الدور المداري هو مدة دورة واحدة للقمر الاصطناعي في مداره حول الأرض.

حسب القانون الثالث لكيبلير:

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G.M}$$

حيث : M كتلة الأرض و $r = R + h$ شعاع مدار القمر الاصطناعي.

العلاقة السابقة تكتب:

$$\frac{T^2}{(R+h)^3} = \frac{4\pi^2}{G.M}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G.M}(R+h)^3$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{G.M}}$$

ت.ع:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{[(6380+205)\times 10^3]^3}{6,67.10^{-11}\times 5,98.10^{24}}}$$

$$T = 5,32.10^3 s = 1h29min$$

يساوي التردد مقلوب الدور:

$$N = \frac{1}{T}$$

ت.ع:

$$N = \frac{1}{5,32.10^3} = 1,88.10^{-4} Hz$$

2-سرعة القمر الاصطناعي:

$$V = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(R+h)}{T}$$

ت.ع:

$$V = \frac{2\pi(6380+205)\times 10^3}{5,32.10^3} = 7,78.10^3\ m.s^{-1}$$

3- تسارع القمر الاصطناعي:

-التسارع المماسي: $a_t = \frac{dV}{dt}$

بما أن حركة القمر الاص2طناعي منتظمة ، فإن : $V = cst$ وبالتالي : $a_t = \frac{dV}{dt} = 0$

-التسارع المنظمي: $a_N = \frac{V^2}{r} = \frac{V^2}{R+h}$

ت.ع:

$$a_N = \frac{(7,78.10^3)^2}{(6380+205)\times 10^3} = 9,20\ m.s^{-1}$$

-التسارع الكلي: $a = \sqrt{{a_T}^2 + {a_N}^2}$

بما أن التسارع المماسي منعدم أي: $a_t = 0$ فإن:

$$a = a_N = 9,20\ m.s^{-1}$$

Moutamadris.ma

4-شدة القوة المطبقة على القمر الاصطناعي:
حسب القانون الثاني لنيوتن :

$$F = ma_N$$

ت.ع:

$$F = 87,3 \times 9,20 = 803N$$

ملحوظة :

يمكن استعمال شدة قوة التجاذب الكوني:

$$F = G\frac{M.m}{(R+h)^2}$$

تمرين 3 :

1-الشروط لكي يكون قمرا ساكنا بالنسبة للأرض :

*ينبغي أن يقع مداره في مستوى خط الإستواء.
*أن يدور في نفس منحى دوران الأرض حول محورها القطبي.
*أن يكون دوره المداري T مساويا لدور حركة دوران الأرض 0 حور محورها القطبي .

2-تعبير التسارع:

في المعلم المركزي الأرضي ، يخضع القمر الإصطناعي (S) الى قوة التجاذب الكوني التي تبطبقها الأرض عليه :

$$\vec{F}_{T/S} = -G\frac{m.m_0}{{r_0}^2}\vec{u}_{TS}$$

نطبق القانون الثاني لنيوتن :

$$\vec{F}_{T/S} = m_0.\vec{a}$$

أي: $-G\frac{m.m_0}{{r_0}^2}\vec{u}_{TS} = m_0.\vec{a}$

باعتبار المتجهة الواحدية $\vec{n}$ هي : $-\vec{u}_{TS} = \vec{n}$
نستنتج :

$$(1) \quad \vec{a} = \frac{G.m_0}{{r_0}^2}\vec{n}$$

3-نبين أن الحركة منتظمة ودائرية:

Moutamadris.ma

في معلم فريني $(S, \vec{u}, \vec{n})$ نكتب تسارع القمر الإصطناعي كالتالي :

$$\vec{a} = \frac{dV}{dt}\vec{u} + \frac{V^2}{\rho}\vec{n} \quad (2)$$

بمقارنة العلاقتين (1) و (2) نكتب:

$\frac{dV}{dt} = 0$ أي أن : $V = cst$ ومنه فإن الحركة منتظمة.

بمقارنة العلاقتين (1) و (2) نكتب:

$\frac{V^2}{\rho} = \frac{G.m_0}{{r_0}^2}$ مع : $\rho = r_0$ نجد : $r_0 = \frac{G.m}{V^2} = cst$ وبالتالي الحركة دائرية.

4-تعبير الدور T :

نعلم أن : $T = \frac{2\pi r_0}{V}$

و $V^2 = \frac{G.}{r_0}$ ومنه : $V = \sqrt{\frac{G.m}{r_0}}$

نستنتج تعبير T :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{{r_0}^3}{G.m}}$$

5-تعبير الثابتة K :

تعبير الدور T يكتب :

$$T^2 = 4\pi^2\frac{{r_0}^3}{G.m}$$

$$\frac{T^2}{{r_0}^3} = \frac{4\pi^2}{G.m} \quad (3)$$

بما أن: $\frac{T^2}{{r_0}^3} = K$

فإن: $K = \frac{4\pi^2}{G.m}$

6- تعبير النسبة $\frac{M}{m}$:

Moutamadris.ma

-باعتبار حركة القمر (S) حول الأرض مع $T = T_0$ العلاقة (3) تكتب: $\frac{T_0^2}{r_0^3} = \frac{4\pi^2}{G.m}$

-باعتبار حركة الأرض (T) حول الشمس مع $T = T_T$ و $r_0 = r_T$ العلاقة (3) تكتب: $\frac{T_T^2}{r_T^3} = \frac{4\pi^2}{G.M}$

M كتلة الشمس

ننجز قسمة العلاقة الأولى على العلاقة الثانية :

$$\frac{\frac{T_0^2}{r_0^3}}{\frac{T_T^2}{r_T^3}} = \frac{\frac{4\pi^2}{G.m}}{\frac{4\pi^2}{G.M}}$$

$$\frac{M}{m} = \left(\frac{T_0}{T_T}\right)^2 . \left(\frac{r_T}{r_0}\right)^3$$

ت.ع:

$$\frac{M}{m} = \left(\frac{1}{365}\right)^2 . \left(\frac{1,5.10^8}{4,2.10^4}\right)^3 = 3,4.10^5$$

كتلة الشمس أكبر بحوالي 340 000 مرة من كتلة الارض.

$$m = \frac{2.10^{30}}{3,4.10^5} = 5,88.10^{24}\ kg$$

تمرين 4 :

1-المعلم المناسب لهذه الدراسة :

المعلم المركزي الأرضي ، أصله مركز الأرض ومحاوره موجهة نحو ثلاث نجوم ثابتة .

2-لكي يكون القمر الإصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض يجب :

- أن يساوي دوره المداري دو دوران الأرض حول محورها القطبي .
- أن يدور في منحى دوران الأرض حمل نفسها .
- أن يدور في مستوى خط الإستواء.



3-تمثيل المتجهات : $\vec{F}_{T/S}$ و $\vec{V}$ و $\vec{a}$:

أنظر الشكل

Moutamadris.ma

4-تعبير سرعة القمر الإصطناعي :

يخضع القمر الإصطناعي الى قوة التجاذب

الكوني: $\vec{F}_{T/S} = -G\frac{M_T.m}{(R_T+h)^2}\vec{u}_{TS}$

القانون الثاني لنيوتن يكتب:

$$\vec{F}_{T/S} = m\vec{a}$$

باعتبا معلم فريني $(S, \vec{u}, \vec{n})$ نسقط العلاقة على $(S, \vec{n})$ نجد :

$$F_{T/S} = m.a_N$$

$$G\frac{M_T.m}{(R_T+h)^2} = m.\frac{V^2}{R_T+h}$$

$$V^2 = \frac{G.M_T}{R_T+h} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{G.M_T}{R_T+h}}$$

ت.ع:

$$V = \sqrt{\frac{6,67.10^{-11} \times 5,98.10^{24}}{6350.10^3 + 36000 \times 10^3}} = 3069m.s^{-1}$$

5-إثبات القانون الثالث لكيبلير :

نعلم أن:

$T = \frac{2\pi(R_T+h)}{V}$ أي : $T^2 = \frac{4\pi^2(R_T+h)^2}{V^2}$

كما أن:

$$V^2 = \frac{G.M_T}{R_T+h}$$

وبالتالي :

$$T^2 = \frac{4\pi^2(R_T+h)^2}{\frac{G.M_T}{R_T+h}} = \frac{4\pi^2(R_T+h)^3}{G.M_T}$$

نستنتج القانون الثالث لكيبلير:

$$\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_T}$$

$$\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = K$$

Moutamadris.ma

6-حساب دور حركة الأرض حول محورها القطبي:

نعلم أن :

$$T = \frac{2\pi(R_T + h)}{V}$$

ت.ع:

$$T = \frac{2\pi(6350 + 36000) \times 10^3}{3069} = 86703s$$