Généralités sur les fonctions

Vocabulaire

Soit D un ensemble de R
Définir une fonction f sur D, c'est associer à chaque réel x de D un unique réel noté f(x).
On écrit : f : x ⟼ f(x) (on lit : « f est la fonction qui à x associe f de x »)
D est l'ensemble de définition de la fonction f.
x est la variable.
f(x) est l'image de x par f.
Si y = f(x) , on dit que x est un antécédent de y par f.

Représentation graphique

Un repère du plan étant choisi, on appelle courbe représentative d'une fonction f, notée C_f , l'ensemble des points M de coordonnées (x ; f(x)) où x ∈ D.
Dire « M(x ; y) appartient à la courbe représentative de f » équivaut à dire « x appartient à D et y = f(x) ».
On dit que la courbe a pour équation y = f(x).

Sens de variations

I est un intervalle contenu dans l'ensemble de définition D de la fonction f.

Dire que f est strictement croissante sur I signifie que pour tous réels x_1 et x_2 de I : *Si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) < f(x_2)$.* *(Une fonction croissante conserve l'ordre.)*	

Dire que f est strictement décroissante sur I signifie que pour tous réels x_1 et x_2 de I : *Si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) > f(x_2)$.* *(Une fonction décroissante change l'ordre.)*	

Pour une fonction croissante ou décroissante, on remplace les inégalités strictes de $f(x_1)$ et $f(x_2)$.par des inégalités larges.
Dire que f est constante sur I signifie que pour tous réels x_1 et x_2 de I , on a $f(x_1) = f(x_2)$.
Une fonction monotone sur I est une fonction soit croissante sur I, soit décroissante sur I.

Maximum - Minimum

M est le maximum de f sur I signifie que M est la plus grande valeur prise par f sur I : *Pour tout réel x de I* *$f(x) \leq M = f(a)$.*		*m est le minimum de f sur I signifie que m est la plus petite valeur prise par f sur I :* *Pour tout réel x de I* *$f(x) \geq m = f(b)$.*

Parité

Fonction paire

On dit que f est paire si pour tout x de D, on a : (-x) ∈ D et f(-x) = f(x).
Soit C la courbe représentative d'une fonction f.
C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Fonction impaire

g est impaire si pour tout x de D on a : -x ∈ D et g(-x) = - g(x).
Soit C la courbe représentative d'une fonction g.
C est symétrique par rapport à O.

Moutamadris.ma

Résolution d'une équation :

Résolution f(x) = k.	*Résolution de f(x) = g(x).*
On trace la droite d'équation y = k et on lit les abscisses des points d'intersection avec la courbe. 	*On trace les deux courbes C_f et C_g et on lit les abscisses des points d'intersection.* 
$S = \{x_1, x_2\}$	$S = \{x_1, x_2, x_3\}$

Résolution d'une inéquation

Résolution f(x) ≥ 0.	*Résolution f(x) ≥ k.*	*Résolution de f(x) ≥ g(x).*
On lit les intervalles sur lesquels la courbe est au-dessus des axes des abscisses. 	*On trace la droite d'équation y = k et on lit les intervalles sur lesquels la courbe est au-dessus de cette droites.* 	*On trace les deux courbes C_f et C_g et on lit les intervalles sur lesquels C_f est au-dessus de C_g.* 
$S = [x_1, x_2] \cup [x_3, +\infty[$	$S = [x_1, x_2]$	$S =]-\infty, x_1] \cup [x_2, x_3]$

Moutamadris.ma

Fonctions de références : parabole-hyperbole

Soit $(O,\vec{i},\vec{j})$ un repère orthogonal .

Parabole

*)La courbe représentative de la fonction f définie sur R par $f(x)=ax^2$, $a\neq 0$ est une parabole de sommet O et d'axe de symétrie la droite d'équation $x=0$.

*) La courbe représentative de la fonction f définie sur R par $f(x)=a(x-\beta)^2$, $a\neq 0$ est une parabole de sommet $S(\alpha,0)$ et d'axe de symétrie la droite d'équation $x=\alpha$.

*) La courbe représentative de la fonction f définie sur R par $f(x)=x^2+\beta$, $a\neq 0$ est une parabole de sommet $S(0,\beta)$ et d'axe de symétrie la droite d'équation $x=0$.

*)La fonction f définie sur R par $f(x)=ax^2+bx+c$, $a\neq 0$,

f(x) peut s'écrire sous la forme $f(x)=a(x-\alpha)^2+\beta$, $a\neq 0$

Donc la courbe représentative de f est une parabole de sommet $S(\alpha,\beta)$ et d'axe de symétrie la droite d'équation $x=\alpha$.

Soit le trinôme $f(x)=ax^2+bx+c$ avec $a\neq 0$.

	$a>0$	$a<0$
$\Delta<0$		
$\Delta=0$		
$\Delta>0$		

Hyperbole

*) La courbe représentative de la fonction $f(x)=\frac{a}{x}$, $a\neq 0$ est une hyperbole de centre O et d'asymptotes les droites d'équations $x=0$ et $y=0$.

*) La courbe représentative de la fonction $f(x)=\frac{1}{x}+\beta$ est une hyperbole de centre $I(0,\beta)$ et d'asymptotes les droites d'équations $x=0$ et $y=\beta$.

*) La courbe représentative de la fonction $f(x)=\frac{a}{x+\alpha}$, $a\neq 0$ est une hyperbole de centre $I(-\alpha,0)$ et d'asymptotes les droites d'équations $x=-\alpha$ et $y=0$.

Moutamadris.ma

*) La courbe représentative de la fonction $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$, $c\neq 0$ est une hyperbole de centre $I\left(-\dfrac{d}{c},\dfrac{a}{c}\right)$ et d'asymptotes les droites d'équations $x=-\dfrac{d}{c}$ et $y=\dfrac{a}{c}$.

Exemples (tous les cas possibles)

$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$; $a \neq 0$
$x \mapsto ax^2$

$Si\ a > 0$ (exemple $a = 4$)



$Si\ a < 0$ (exemple $a = -4$)



$h(x) = 2(x-3)^2$



$k(x) = x^2 - 3$



Moutamadris.ma

$p(x) = 3x^2 - 2x + 1$



$(exemple\ g(x) = \frac{3}{x}\ )$



$(exemple\ g(x) = \frac{-3}{x}\ )$



$(exemple\ h(x) = \frac{1}{x} + 3\ )$



Moutamadris.ma

$(exemple\ k(x) = \frac{2}{x+3}\ )$



$(exemple\ p(x) = \frac{2x+5}{4x-3}\ )$