



المعامل:	9	المادّة:	الرياضيات
مدة الإنجاز:	4س	الشعب(ة):	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)

التمرين الأول: (3,25 نقطة)

نذكر أن $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ حلقة واحدة و $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ فضاء متجهي حقيقي و $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ جسم تبادلي.
نضع:

$$E = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} / a, b \in \mathbb{R} \right\} \text{ و } J = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \text{ و } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) أ) بين أن $(E, +, \cdot)$ فضاء متجهي جزئي من الفضاء المتجهي الحقيقي $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ 0,75

(ب) بين أن الأسرة (I, J) أساس في الفضاء المتجهي $(E, +, \cdot)$ 0,5

(2) نعتبر التطبيق: $f: \mathbb{C}^* \longrightarrow E^*$
حيث: $E^* = E \setminus \{M(0,0)\}$ $a + ib \longrightarrow M(a, b)$

(أ) بين أن E جزء مستقر من $(M_2(\mathbb{R}), \cdot)$ 0,25

(ب) بين أن f تشاكل تقابلي من (\mathbb{C}^*, \cdot) نحو (E^*, \cdot) 0,5

(3) بين أن $(E, +, \cdot)$ جسم تبادلي. 0,5

(4) حل في E المعادلة: $J \times X^3 = I$ (حيث $X^3 = X \times X \times X$) 0,75

التمرين الثاني: (3,75 نقطة)

ليكن a عددا عقديا غير منعدم و \bar{a} مرافق العدد a .

-I نعتبر في المجموعة \mathbb{C} المعادلة: $(G) \quad iz^2 + (a + \bar{a} - i)z - \bar{a} - ia\bar{a} = 0$

(1) أ) تحقق أن مميز المعادلة (G) هو: $\Delta = (a - \bar{a} - i)^2$ 0,5

(ب) حل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة (G) . 0,5

(2) بين أن a حل للمعادلة (G) إذا و فقط إذا كان $\text{Re}(a) = \text{Im}(a)$ (حيث $\text{Re}(a)$ هو الجزء

الحقيقي للعدد العقدي a و $\text{Im}(a)$ هو جزءه التخيلي)

الصفحة
2 / 4

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة العادية 2008)
الموضوع

C: NS24

المادة :	الرياضيات
----------	-----------

الشعب(ة):	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)
-----------	--------------------------------

II- المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نفترض أن $\text{Re}(a) \neq \text{Im}(a)$
نعتبر النقط A و B و C التي أحاقها على التوالي هي a و $i\bar{a}$ و $1+ia$

$$Z = \frac{(1+ia) - a}{(i\bar{a}) - a} \quad (1) \quad \text{نضع :}$$

$$\bar{Z} = \frac{(i-1)\bar{a} - i}{i\bar{a} - a} \quad (أ) \quad \text{تحقق أن :} \quad 0,5$$

$$\text{Im}(a) = \frac{1}{2} \quad (ب) \quad \text{بين أن النقط A و B و C مستقيمة إذا و فقط إذا كان} \quad 0,5$$

$$(2) \quad \text{نفترض في هذا السؤال أن} \quad \text{Im}(a) \neq \frac{1}{2}$$

نعتبر R_1 الدوران الذي مركزه A و زاويته $-\frac{\pi}{2}$ و R_2 الدوران الذي مركزه A و زاويته $\frac{\pi}{2}$

$$\text{نضع : } R_1(B) = B' \text{ و } R_2(C) = C'$$

لتكن النقطة E منتصف القطعة [BC]

(أ) حدد b' و c' لحقي النقطتين B' و C' على التوالي . 0,5

(ب) بين أن المستقيمين (AE) و (B'C') متعامدان و أن $B'C' = 2AE$ 0,75

التمرين الثالث: (3 نقط)

I- نعتبر في المجموعة \mathbb{Z}^2 المعادلة التالية : $35u - 96v = 1$ (E)

(1) تحقق أن الزوج (11,4) حل خاص للمعادلة (E) 0,25

(2) استنتج مجموعة حلول المعادلة (E) 0,5

II- نعتبر في المجموعة \mathbb{N} المعادلة التالية: $x^{35} \equiv 2 \pmod{97}$ (F)

(1) ليكن x حلا للمعادلة (F)

(أ) بين أن العدد 97 أولي و أن x و 97 أوليان فيما بينهما . 0,5

(ب) بين أن : $x^{96} \equiv 1 \pmod{97}$ 0,5

(ج) بين أن : $x \equiv 2^{11} \pmod{97}$ 0,5

(2) بين أنه إذا كان العدد الصحيح الطبيعي x يحقق $x \equiv 2^{11} \pmod{97}$ فإن x حل للمعادلة (F) 0,25

(3) بين أن مجموعة حلول المعادلة (F) هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية التي تكتب على 0,5

الشكل $11+97k$ حيث $k \in \mathbb{N}$

التمرين الرابع: (10 نقط)

I – لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على \mathbb{R}_+ بما يلي : $f(x) = 2x - e^{-x^2}$ وليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

(1) أ) احسب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$ ثم أول هندسيا النتيجة المحصل عليها. 0,5

ب) احسب $f'(x)$ لكل x من \mathbb{R}_+ ثم ضع جدول تغيرات الدالة f 0,5

ج) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في \mathbb{R}_+ و أن $0 < \alpha < 1$ 0,5

د) ادرس إشارة $f(x)$ على المجال $[0,1]$ 0,5

(2) أنشئ المنحنى (C) . (نأخذ : $\alpha \approx 0,4$) 0,5

II – نعتبر الدالتين العدديتين φ و g للمتغير الحقيقي x المعرفتين على \mathbb{R}_+ بما يلي :

$$g(x) = x^2 - \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{و} \quad \begin{cases} \varphi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt ; x > 0 \\ \varphi(0) = 1 \end{cases}$$

(1) أ) بين أن : $\frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$: $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) (\exists c \in]0, x[)$ 0,5

ب) استنتج أن : $\int_0^1 e^{-t^2} dt < 1$ 0,5

(2) أ) بين أن : $g(\alpha) = \int_0^\alpha f(t) dt$ 0,5

ب) بين أن الدالة g قابلة للاشتقاق على \mathbb{R}_+ و أن : $g'(x) = f(x)$; $(\forall x \in \mathbb{R}_+)$ 0,5

ج) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β في المجال $]\alpha, 1[$ 0,5

(3) أ) بين أن الدالة φ متصلة على اليمين في الصفر. 0,5

ب) باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن : $\varphi(x) = e^{-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$; $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*)$ 0,5

ج) بين أن الدالة φ قابلة للاشتقاق على \mathbb{R}_+^* و أن : $\varphi'(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$; $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*)$ 0,75

د) بين أن : $\varphi([0,1]) \subset]0,1[$ 0,5

(4) أ) بين أنه لكل عدد حقيقي x من \mathbb{R}_+ لدينا : $\int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}$ 0,5

الصفحة
4 / 4

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة العادية 2008)
الموضوع

C: NS24

المادة :	الرياضيات
----------	-----------

الشعب(ة):	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)
-----------	--------------------------------

(ب) بين أن : $(\forall x \in]0,1[); \varphi'(x) \leq \frac{2}{3}$	0,5
(ج) بين أن : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \varphi(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$	0,25
(5) نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بما يلي : $u_0 = \frac{2}{3}$ و $u_{n+1} = \varphi(u_n)$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)	
(أ) بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 \leq u_n \leq 1$	0,5
(ب) بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n - \beta \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$	0,5
(ج) استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة و حدد نهايتها.	0,5

لدينا E جزء غير فارغ من $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ لأن : $M(0,0) \in E$.

ليكن γ و β عددين حقيقيين و $M(a,b)$ و $M(c,d)$ مصفوفتين من E .

$$\begin{aligned} \gamma M(a,b) + \beta M(c,d) &= \gamma \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c & \sqrt{3}d \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \gamma a + \beta c & \sqrt{3}(\gamma b + \beta d) \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}(\gamma b + \beta d) & \gamma a + \beta c \end{pmatrix} \\ &= M(\gamma a + \beta c, \gamma b + \beta d) \in E \end{aligned}$$

إذن :

$(\forall \gamma, \beta \in \mathbb{R}), (\forall M(a,b), M(c,d)) : \gamma M(a,b) + \beta M(c,d) \in E$

إذن : $(E, +, \cdot)$ فضاء متجهي جزئي من الفضاء المتجهي $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

من الواضح أن الأسرة (I, J) مولدة للفضاء المتجهي $(E, +, \cdot)$.

لأن : $M(a,b) \in E : M(a,b) = \alpha I + \beta J$

لتكن $\alpha I + \beta J$ تأليفة خطية منعمة للمصفوفتين I و J .

$$\Leftrightarrow \alpha I + \beta J = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{3}\beta \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$$

إذن (I, J) أسرة حرة (أو مستقلة خطيا)

و بالتالي (I, J) أساس للفضاء المتجهي $(E, +, \cdot)$.

لتكن $M(a,b)$ و $M(c,d)$ مصفوفتين من الفضاء المتجهي E

$$\begin{aligned} M(a,b) \times M(c,d) &= (\alpha I + \beta J) \times (\gamma I + \delta J) \\ &= \alpha\gamma I + \alpha\delta J + \beta\gamma J + \beta\delta J^2 \end{aligned}$$

و لدينا :

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$\begin{aligned} M(a,b) \times M(c,d) &= (\alpha\gamma - \beta\delta)I + (\alpha\delta + \beta\gamma)J \\ &= M(\alpha\gamma - \beta\delta, \alpha\delta + \beta\gamma) \in E \end{aligned}$$

إذن : E جزء مستقر من $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

ليكن $(a + ib)$ و $(c + id)$ عددين عقديين غير منعدمين.

لدينا :

$$\begin{aligned} f((a + ib) \times (c + id)) &= f((ac - bd) + i(ad + bc)) \\ &= M((ac - bd), (ad + bc)) \\ &= M(a,b) \times M(c,d) \\ &= f(a + ib) \times f(c + id) \end{aligned}$$



إذن : f تشاكل من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (E^*, \times) .

لتكن $M(a,b)$ مصفوفة من E^* .

لنحل المعادلة : $f(x + iy) = M(a,b)$

$$\Leftrightarrow M(x,y) = M(a,b)$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & \sqrt{3}y \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$$

إذن المعادلة $f(x + iy) = M(a,b)$ تقبل حلا وحيدا في \mathbb{C}^*

إذن : f تقابل من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (E^*, \times) .

خلاصة : f تشاكل تقابلي من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (E^*, \times) .

نعلم أن $(E, +, \cdot)$ فضاء متجهي حقيقي

إذن : $(E, +)$ زمرة تبادلية (1)

و لدينا كذلك (\mathbb{C}^*, \times) زمرة تبادلية.

إذن : (E^*, \times) زمرة تبادلية لأن f تشاكل تقابلي (2).

بما أن الضرب \times توزيعي بالنسبة للجمع في $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

و بما أن E جزء مستقر من $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

فإن \times توزيعي بالنسبة للجمع في E (3)

من (1) و (2) و (3) نستنتج أن : $(E, +, \times)$ جسم تبادلي.

لنحل في E المعادلة : $J \times X^3 = I$

$$\Leftrightarrow -J \times J \times X^3 = -J$$

$$\Leftrightarrow -J^2 \times X^3 = -J$$

$$\Leftrightarrow X^3 = -J$$

$$\Leftrightarrow (M(a, b))^3 = M(0, -1)$$

$$\Leftrightarrow (f(a + ib))^3 = f(-i)$$

$$\Leftrightarrow f((a + ib)^3) = f(-i)$$

$$\Leftrightarrow (a + ib)^3 = -i$$

لنحل إذن في \mathbb{C} المعادلة : $z^3 = -i$

نضع : $z = re^{i\theta}$ إذن : $r^3 e^{3i\theta} = e^{-\frac{\pi i}{2}}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \theta = \frac{-\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \{0, 1, 2\} \end{cases}$$

من أجل $k = 0$ لدينا : $z_0 = e^{-\frac{\pi i}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

إذن المصفوفة $M\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ حل للمعادلة الأولى في E

إذا كان $k = 1$ فإن : $z_1 = e^{\frac{\pi i}{2}} = i$

إذن المصفوفة $M(0, 1)$ حل للمعادلة الأولى في E

إذا كان $k = 2$ فإن : $z_2 = e^{\frac{7\pi i}{6}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

إذن المصفوفة $M\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ حل للمعادلة الأولى في E

خلاصة : مجموعة حلول المعادلة $J \times X^3 = I$ في E تكتب على الشكل :

$$S = \left\{ \left(\frac{\sqrt{3}}{2}I - \frac{1}{2}J \right), (J), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}I - \frac{1}{2}J \right) \right\}$$

التمرين الثاني : (3,75 ن)

■ (I) 1 (i)

بعد عملية النشر و التبسيط نحصل على :

$$\Delta = (a - \bar{a} - i)^2$$

■ (I) 1 (b)

لدينا : $\Delta = (a - \bar{a} - i)^2$

$$z_1 = \frac{(i - a - \bar{a}) - (a - \bar{a} - i)}{2i} = 1 + ai \quad \text{إذن :}$$

$$z_2 = \frac{(i - a - \bar{a}) + (a - \bar{a} - i)}{2i} = \bar{a}i \quad \text{و}$$

إذن مجموعة حلول المعادلة (G) تكتب على شكل :

$$S = \{1 + ai, \bar{a}i\}$$

■ (II) 2

لدينا المعادلة (G) تقبل الحلين : $1 + ai$ و $\bar{a}i$

إذا كان a حلا للمعادلة (G) فإن : $a = \bar{a}i$ أو $a = 1 + ai$

يعني : $Re(a) + i Im(a) = Im(a) + i Re(a)$

أو : $(1 - Im(a)) + i Re(a) = Re(a) + i Im(a)$

إذن في كلتا الحالتين نحصل على : $Im(a) = Re(a)$

عكسيا :

ليكن a عددا عقديا مكتوبا على شكل $a = r + ri$

لدينا : $\bar{a}i = (r - ri)i = ri + r = a$

إذن a حل للمعادلة (G) لأنه مكتوب على شكل $\bar{a}i$

و بالتالي : $Im(a) = Re(a) \Leftrightarrow a$ حل لـ (G)

■ (II) 1 (i)

$$\bar{z} = \overline{\left(\frac{(1 + ai) - a}{i\bar{a} - a} \right)} = \frac{(1 - \bar{a}i) - \bar{a}}{-ia - \bar{a}} = \frac{1 - i\bar{a} - \bar{a}}{-ia - \bar{a}}$$



$$= \frac{1 - \bar{a}(i + 1)}{-ia - \bar{a}}$$

نضرب البسط و المقام في العدد العقدي $(-i)$ نحصل على :

$$\bar{z} = \frac{-i + \bar{a}(i - 1)}{-a + \bar{a}i}$$

2) ب

لدينا E هي منتصف القطعة $[BC]$.

$$z_E = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{i\bar{a} + ai + 1}{2} \quad \text{إذن :}$$

$$\begin{aligned} \frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} &= \frac{i(1-a) - (\bar{a} + ia + a)}{\frac{i\bar{a} + ai + 1}{2} - a} \quad \text{و لدينا :} \\ &= 2 \left(\frac{i - 2ai - \bar{a} - a}{i\bar{a} + ai + 1 - 2a} \right) \\ &= 2i \left(\frac{1 - 2a + \bar{a}i + ai}{i\bar{a} + ai + 1 - 2a} \right) \\ &= 2i \end{aligned}$$

$$(\#) \quad \frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} = 2i \quad \text{إذن :}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \arg \left(\frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} \right) &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \\ \Leftrightarrow \overline{(AE, B'C')} &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \\ \Leftrightarrow (AE) &\perp (B'C') \end{aligned}$$

$$\left| \frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} \right| = 2 \quad (\#) \quad \text{و لدينا كذلك حسب النتيجة}$$

$$|z_{C'} - z_{B'}| = 2|z_E - z_A| \quad \text{إذن :}$$

$$\Leftrightarrow B'C' = 2AE$$

التمرين الثالث : (3,0 ن)

1) (I) ■

$$35 \times 11 - 96 \times 4 = 1 \quad \text{لدينا :}$$

إذن : (11,4) حل خاص للمعادلة (E).

2) (I) ■

$$35 \times 11 - 96 \times 4 = 1 \quad \text{لدينا حسب السؤال 1) :}$$

$$35 \wedge 96 = 1 \quad \text{إذن حسب ميرهنه Bezout :}$$

ليكن (u, v) الحل العام للمعادلة (E).

$$\begin{cases} 35u - 96v = 1 \\ 35 \times 11 - 96 \times 4 = 1 \end{cases} \quad \text{لدينا :}$$

$$\Rightarrow 35(u - 11) = 96(v - 4) \quad \otimes$$

1) ب

ننتقل من كون $A(a)$ و $B(i\bar{a})$ و $C(1+ai)$ نقط مستقيمية.

$$\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1+ai) - a}{i\bar{a} - a} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{(1+ai) - a}{i\bar{a} - a} \right) = \frac{(1+ai) - a}{i\bar{a} - a}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1 - \bar{a}i) - \bar{a}}{-ia - \bar{a}} = \frac{(1+ai) - a}{i\bar{a} - a}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1 - \bar{a}i) - \bar{a}}{-ia - \bar{a}} = \frac{(i-a) - ai}{-\bar{a} - ai}$$

$$\Leftrightarrow (1 - \bar{a}i) - \bar{a} = (i-a) - ai$$

$$\Leftrightarrow i(a - \bar{a}) + (a - \bar{a}) = (i-1)$$

$$\Leftrightarrow (a - \bar{a}) = \frac{(i-1)}{(i+1)}$$

$$\Leftrightarrow (2\Im(a))i = \frac{-2i}{-2} = i$$

$$\Leftrightarrow \Im(a) = \frac{1}{2}$$

2) ا

ننتقل من الكتابة : $\mathcal{R}_1(B) = B'$

$$\Leftrightarrow (z_{B'} - z_A) = e^{-\frac{\pi}{2}i} (z_B - z_A)$$

$$\Leftrightarrow (b' - a) = -i(i\bar{a} - a)$$

$$\Leftrightarrow b' = \bar{a} + ia + a$$

بنفس الطريقة ننتقل من الكتابة : $\mathcal{R}_2(C) = C'$

$$\Leftrightarrow (z_{C'} - z_A) = e^{\frac{\pi}{2}i} (z_C - z_A)$$

$$\Leftrightarrow (c' - a) = i(1 + ai - a)$$

$$\Leftrightarrow c' = i(1 - a)$$

■ (II) ②

لدينا : $x \equiv 2^{11}[97]$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^{35} &\equiv 2^{11 \times 35}[97] \\ \Rightarrow x^{35} &\equiv 2^{96 \times 4 + 1}[97] \\ \Rightarrow x^{35} &\equiv 2^{96 \times 4} \times 2[97] \quad (*) \end{aligned}$$



و نعلم أن 97 و 2 عددان أوليان :

إذن حسب *Fermat* : $2^{96} \equiv 1[97]$

يعني : $2^{96 \times 4} \equiv 1[97]$ أي : $2^{96 \times 4} \times 2 \equiv 2[97]$

بالرجوع إلى المتوافقة (*) نحصل على : $x^{35} \equiv 2[97]$

و بالتالي : x حل للمعادلة (F) .

■ (II) ③

في الأسئلة السابقة تمكنا من إثبات التكافؤ التالي :

$$x^{35} \equiv 2[97] \Leftrightarrow x \equiv 2^{11}[97]$$

نستعين بالآلة الحاسبة للحصول على :

$$2^{11} = 2048 \quad \text{و منه كذلك} : 2^{11} \equiv 11[97]$$

إذن : $x \equiv 11[97]$

$$\text{أي} : x = 97k + 11 \quad (\exists k \in \mathbb{Z})$$

ومنه : مجموعة حلول المعادلة (F) نكتب على الشكل :

$$S = \{97k + 11 ; k \in \mathbb{Z}\}$$

التمرين الرابع : (10 ن)

■ (I) ①

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - e^{-x^2} - 2x) = 0 \quad \text{لدينا}$$

يعني أن المستقيم ذو المعادلة $y = 2x$ مقارب لـ (ح) بجوار $+\infty$

■ (I) ②

ليكن x عنصرا من \mathbb{R}_+

$$\text{لدينا} : f'(x) = 2 + 2xe^{-x^2} > 0$$

إذن f دالة تزايدية قطعاً على \mathbb{R}_+

$$\text{و لدينا} : \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - e^{-x^2}) = +\infty$$

نستنتج إذن جدول تغيرات f كما يلي :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	-1	$+\infty$

إذن : $35 / 96(v - 4)$

و بما أن : $35 \wedge 96 = 1$

فإنه حسب *Gauss* : $35 / (v - 4)$

إذن : $(\exists k \in \mathbb{Z}) : v = 35k + 4$

نعوض v بقيمته في المتساوية \otimes نحصل على :

$$35(u - 11) = 96 \times 35k$$

إذن : $u = 96k + 11$

و بالتالي مجموعة حلول المعادلة (E) نكتب على الشكل :

$$S = \{(96k + 11 ; 35k + 4) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

■ (II) ①

لدينا 2 و 3 و 5 و 7 هي الأعداد الأولية التي مربعاتها أصغر من 97 و لا أحد من هذه الأعداد يقسم العدد 97
إذن : 97 عدد أولي .

ليكن : $x \wedge 97 = d$ إذن : $d / 97$

و بما أن 97 عدد أولي فإنه يمتلك قاسمين صحيحين طبيعيين فقط و هما 97 و 1 .

ومنه : $d = 1$ أو $d = 97$

نفترض أن : $d = 97$

لدينا $x \wedge 97 = d$ ومنه : d / x

ومنه : $x \equiv 0[97]$ أي : $x^{35} \equiv 0[97]$

إذن : x ليس حلاً للمعادلة (F) و هذا يتناقض مع المعطيات الصريحة .

و بالتالي : $d = 1$ ومنه : $x \wedge 97 = 1$

■ (II) ②

لدينا : $x \wedge 97 = 1$ و 97 عدد أولي .

إذن حسب مبرهنة (*Fermat*) : $x^{97-1} \equiv 1[97]$

أي : $x^{96} \equiv 1[97]$

■ (II) ③

نعلم أن (11,4) حل للمعادلة (E) .

و نعلم كذلك أن : $35 \times 11 - 96 \times 4 = 1$

لدينا x حل للمعادلة (F) .

$$(1) \quad x^{35 \times 11} \equiv 2^{11}[97] \quad \text{ومنه} : x^{35} \equiv 2[97]$$

و لدينا كذلك حسب نتيجة السؤال ① : $x^{96} \equiv 1[97]$

$$(2) \quad x^{-96 \times 4} \equiv 1[97] \quad \text{إذن}$$

نضرب المتوافتين (1) و (2) طرفاً بطرف نحصل على :

$$x^{35 \times 11 - 96 \times 4} \equiv 2^{11}[97]$$

و بالتالي : $x^1 \equiv 2^{11}[97]$

ب 1 (II) ■

لدينا : $0 < c < x$ إذن : $-x^2 < -c^2 < 0$

ومنه : $e^{-x^2} < e^{-c^2} < 1$

باستعمال نتيجة السؤال 1 (i) نحصل على :

$$(\forall x > 0) : \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt < 1$$

ومن أجل $x = 1$ نحصل على : $\int_0^1 e^{-t^2} dt < 1$

ا 2 (II) ■

لدينا : $\int_0^\alpha f(t) dt = \int_0^\alpha (2t - e^{-t^2}) dt$

$$= 2 \int_0^\alpha t dt - \int_0^\alpha e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{2\alpha^2}{2} - \int_0^\alpha e^{-t^2} dt$$

$$= \alpha^2 - \int_0^\alpha e^{-t^2} dt$$

$$= g(\alpha)$$

ب 2 (II) ■

لدينا : $t \rightarrow e^{-t^2}$ دالة متصلة على \mathbb{R} وبالخصوص على $[0, x]$ بحيث : $x > 0$

إذن فهي تقبل دالة أصلية h على المجال $[0, x]$

بحيث : $h'(x) = e^{-x^2}$

لدينا g دالة قابلة للإشتقاق على \mathbb{R}_+ لأنها فرق دالتين قابلتين للإشتقاق و هما h و $x \rightarrow x^2$.

ولدينا : $g(x) = x^2 - h(x)$

$$\Rightarrow g'(x) = 2x - h'(x)$$

$$= 2x - e^{-x^2}$$

$$= f(x)$$



ج 1 (I) ■

لدينا : f تزايدية قطعاً على : $[0, +\infty[$

إذن : f تزايدية قطعاً على $]0, 1[$

ومنه : f تقابل من المجال $]0, 1[$ نحو صورته $]-1, 2 - \frac{1}{e}[$

ولدينا : $1,6 \approx 2 - \frac{1}{e}$ إذن : $0 \in]-1, 2 - \frac{1}{e}[$

وبالتالي : 0 يمتلك سابقاً واحداً في المجال $]0, 1[$ بالتقابل f

يعني : $\exists! \alpha \in]0, 1[: f(\alpha) = 0$

د 1 (I) ■

لدينا : $f(\alpha) = 0$ و $\alpha \in]0, 1[$

إذا كان $0 < x < \alpha$ فإن : $f(x) < f(\alpha)$ لأن f تزايدية.

ومنه : $f(x) < 0$

إذا كان $\alpha < x < 1$ فإن : $f(x) > f(\alpha)$ لأن f تزايدية.

ومنه : $f(x) > 0$


وبالتالي f موجبة قطعاً على المجال $]\alpha, 1[$

و f سالبة قطعاً على المجال $]0, \alpha[$

و f تنعدم في α

د 1 (I) ■

إنشاء : (\mathcal{C})



ا 1 (II) ■

لدينا : $t \rightarrow e^{-t^2}$ دالة متصلة على \mathbb{R} وبالخصوص على $[0, x]$

إذن فهي تقبل دالة أصلية h على المجال $[0, x]$ بحيث : $h'(x) = e^{-x^2}$

ومنه h متصلة وقابلة للإشتقاق على $[0, x]$

إذن حسب مبرهنة التزايديات المنتهية :

$$(\exists c \in]0, x[) : \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = h'(c)$$

$$\Leftrightarrow (\exists c \in]0, x[) : \frac{1}{x} (h(x) - h(0)) = e^{-c^2}$$

$$\Leftrightarrow (\exists c \in]0, x[) : \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$$

لدينا f موجبة على المجال $]\alpha, 1[$

ومنه : $(\forall x \in]\alpha, 1[) : g'(x) = f(x) > 0$

يعني : g دالة تزايدية قطعاً على $]\alpha, 1[$

ومن g تقابل من المجال $]\alpha, 1[$ نحو المجال $]g(\alpha), g(1)[$

ولدينا كذلك f سالبة على المجال $[0, \alpha]$

إذن : $(\forall x \in [0, \alpha]) : g'(x) = f(x) < 0$

يعني : g دالة تناقصية على المجال $[0, \alpha]$

وبما أن : $\alpha > 0$ فإن : $g(\alpha) < g(0)$

أي : $(1) \boxed{g(\alpha) < 0}$

ومن السؤال (II) 1 (ب) نستنتج أن : $1 - \int_1^1 e^{-t^2} dt > 0$

يعني : $(2) \boxed{g(1) > 0}$

من (1) و (2) نستنتج أن $0 \in]g(\alpha), g(1)[$

إذن الصفر يمتلك سابقاً واحداً β في المجال $]\alpha, 1[$ بالتقابل f .

أو بتعبير أنيق : $(\exists ! \beta \in]\alpha, 1[) ; f(\beta) = 0$

لدينا حسب السؤال (II) 1 (ج)

$(\forall x > 0) (\exists c \in]0, x[) : \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$

ولدينا كذلك : $0 < c < x$

إذن : $e^{-x^2} < e^{-c^2} < 1$

$\Leftrightarrow e^{-x^2} < \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt < 1 ; x > 0$

$\Leftrightarrow e^{-x^2} < \varphi(x) < 1 ; x > 0$

بما أن : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{-x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$

فإنه بالضرورة : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 1 = \varphi(0)$

و بالتالي : φ دالة متصلة على اليمين في الصفر.

لدينا : $\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x 1 \cdot e^{-t^2} dt ; x > 0$



$$= \frac{1}{x} ([uv] - \int uv')$$

$$= \frac{1}{x} ([te^{-t^2}]_0^x + 2 \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt)$$

$$= e^{-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$

نضع : $\psi(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$

لدينا : $\psi'(x) = x^2 e^{-x^2}$

ننطلق من : $\varphi(x) = e^{-x^2} + \frac{2\psi(x)}{x}$

إذن : $\varphi'(x) = -2xe^{-x^2} + \frac{2x^3 e^{-x^2} - 2\psi(x)}{x^2}$

$$= -2xe^{-x^2} + 2xe^{-x^2} - \frac{2}{x^2} \psi(x)$$

$$= \frac{-2}{x^2} \psi(x)$$

$$= \frac{-2}{x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$



انطلاقاً من تعبير $\varphi'(x)$ نستنتج أن : $\varphi'(x) < 0$: $(\forall x > 0)$

إذن φ تناقصية على \mathbb{R}_*^+

وبالخصوص φ متصلة و تناقصية على المجال $[0, 1]$

ليكن : $x \in [0, 1]$ يعني : $0 \leq x \leq 1$

$$\Rightarrow \varphi(0) \geq \varphi(x) \geq \varphi(1)$$

$$\Rightarrow 1 \geq \varphi(x) \geq \int_0^1 e^{-t^2} dt > 0$$

إذن : $\varphi(x) \in [0, 1]$

و بالتالي : $\varphi([0, 1]) \subset [0, 1]$

(I) 4 (II) ■

لدينا : $-t^2 \leq 0$

$$\Leftrightarrow e^{-t^2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow t^2 e^{-t^2} \leq t^2$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \int_0^x t^2 dt$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}$$

(II) 4 (I) ■

$$0 \leq \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3} \quad \text{لدينا :}$$

$$0 \leq \left| \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right| \leq \left| \frac{x^3}{3} \right| \quad \text{إذن :}$$

$$\left| \frac{2}{x^2} \right| \times \left| \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right| \leq \left| \frac{x^3}{3} \right| \times \left| \frac{2}{x^2} \right| \quad \text{و منه :}$$

$$|\varphi'(x)| = \left| \frac{2}{x^2} \right| \times \left| \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right| \quad \text{و نعلم أن :}$$

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{2}{3}|x| \quad \text{إذن :}$$

و بما أن : $0 < x < 1$ فإن : $|x| < 1$

$$(\forall x \in]0,1[) ; |\varphi'(x)| \leq \frac{2}{3} \quad \text{و بالتالي :}$$

(II) 4 (I) ■

ليكن $x > 0$ ننتقل من الكتابة : $\varphi(x) = x$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = x$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x e^{-t^2} dt = x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - \int_0^x e^{-t^2} dt = 0$$

$$\Leftrightarrow g(x) = 0$$



(II) 5 (I) ■

نستعمل في هذا السؤال البرهان بالترجع

من أجل $n = 0$ لدينا : $0 \leq u_0 \leq 1$ نفترض أن : $0 \leq u_n \leq 1$; $(\forall n \in \mathbb{N})$.

$$\Leftrightarrow u_n \in [0,1]$$

$$\Leftrightarrow \varphi(u_n) \in [0,1]$$

لأن : $\varphi([0,1]) \subset [0,1]$

$$\Leftrightarrow 0 \leq u_{n+1} \leq 1$$

و بالتالي : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 \leq u_n \leq 1$

(II) 5 (I) ■

لدينا حسب نتائج الأسئلة السابقة :

دالة متصلة وقابلة للإشتقاق على \mathbb{R}_+^* .إذن يمكن تطبيق TAF بالنسبة للدالة φ على أي مجال من \mathbb{R}_+^* .لدينا : $\beta \in \mathbb{R}_+^*$ و $u_n \in \mathbb{R}_+^*$

إذن حسب مبرهنة التزايد المتناهية :

يوجد عدد حقيقي λ محصور بين β و u_n بحيث :

$$\frac{\varphi(u_n) - \varphi(\beta)}{u_n - \beta} = \varphi'(\lambda)$$

$$\Leftrightarrow |\varphi(u_n) - \varphi(\beta)| = |\varphi'(\lambda)| |u_n - \beta|$$

بما أن : $g(\beta) = 0$ فإنه حسب (II) 4 (I) $\varphi(\beta) = \beta$

$$\text{إذن : } |u_{n+1} - \beta| < |\varphi'(\lambda)| \cdot |u_n - \beta|$$

لدينا حسب السؤال (II) 4 (I) ■

$$(\forall x \in]0,1[) ; |\varphi'(x)| \leq \frac{2}{3}$$

و لدينا $\lambda \in]0,1[$ لأن β و u_n عنصرين من $]0,1[$

$$\text{إذن : } |\varphi'(\lambda)| < \frac{2}{3}$$

$$\text{و منه : } |\varphi'(\lambda)| \cdot |u_n - \beta| < \frac{2}{3} |u_n - \beta|$$

$$\text{و بالتالي : } |u_{n+1} - \beta| < \frac{2}{3} |u_n - \beta|$$



من أجل $(n - 1)$ نحصل على :

$$\begin{aligned} |u_n - \beta| &\leq \frac{2}{3} |u_{n-1} - \beta| \\ &\leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} |u_{n-2} - \beta| \\ &\leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} |u_{n-3} - \beta| \\ &\leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} |u_{n-4} - \beta| \\ &\vdots \\ &\leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \beta| \end{aligned}$$

و بما أن : $0 < \beta < 1$

$$\frac{-1}{3} < \frac{2}{3} - \beta < \frac{2}{3} \quad \text{فإن :}$$

$$-1 < \frac{2}{3} - \beta < 1 \quad \text{إذن :}$$

$$|u_0 - \beta| < 1 \quad \text{أي :}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \beta| < \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{و منه :}$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{و بالتالي :}$$

■ (II) 5 (ع)

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{بما أن :}$$

و $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ متتالية هندسية تؤول إلى الصفر لأن أساسها عدد موجب أصغر من 1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - \beta) = 0 \quad \text{إذن بالضرورة نستنتج أن :}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n) = \beta \quad \text{يعني :}$$

و بالتالي : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية متقاربة و تؤول إلى β .

■ و الحمد لله رب العالمين ■