

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2015 - الدورة الاستدراكية -

الشعب (ة) أو المسلك: شعبة العلوم التجريبية بمسالكها

مادة الرياضيات

## تمرين رقم 1

نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة بما يلي:  $u_n = 4$  و  $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 3$  لكل  $n$  من  $IN$

- 1- بين بالترجع أن  $u_n < 5$  لكل  $n$  من  $IN$
- 2- تحقق من أن  $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$  لكل  $n$  من  $IN$  ثم استنتج أن المتتالية  $(u_n)$  تزايدية .
- 3- استنتج أن المتتالية  $(u_n)$  متقاربة .

4- لتكن  $(v_n)$  المتتالية العددية بحيث  $v_n = 5 - u_n$  لكل  $n$  من  $IN$

- أ- بين أن  $(v_n)$  متتالية هندسية أساسها  $\frac{2}{5}$  ثم اكتب  $v_n$  بدلالة  $n$
- ب- استنتج أن  $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$  لكل  $n$  من  $IN$  واحسب نهاية المتتالية  $(u_n)$  .

## تمرين رقم 2

نعتبر ، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  ، المستوى  $(P)$  الذي معادلته  $2x - z - 2 = 0$  والكرة

$(S)$  التي معادلتها  $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$

- 1- بين أن مركز الكرة  $(S)$  هو النقطة  $\Omega(-1, 0, 1)$  وأن شعاعها هو 3
- 2- أ- أحسب مسافة النقطة  $\Omega$  عن المستوى  $(P)$
- ب- استنتج أن المستوى  $(P)$  يقطع الكرة  $(S)$  وفق دائرة  $(\Gamma)$
- 3- بين أن شعاع الدائرة  $(\Gamma)$  هو 2 و حدد مثلث إحداثيات النقطة  $H$  مركز الدائرة  $(\Gamma)$

## تمرين رقم 3

1- أ- حل في مجموعة الأعداد العقدية  $C$  المعادلة:  $z^2 - 8z + 32 = 0$

ب- نعتبر العدد العقدي  $a$  بحيث  $a = 4 + 4i$

اكتب العدد العقدي  $a$  على الشكل المثلث ثم استنتج أن  $a^{12}$  عدد حقيقي سالب .

2- نعتبر في المستوى العقدي إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  التي ألحاقها على التوالي هي

$a$  و  $b$  و  $c$  بحيث  $a = 4 + 4i$  و  $b = 2 + 3i$  و  $c = 3 + 4i$

ليكن  $z$  لحق نقطة  $M$  من المستوى و  $z'$  لحق النقطة  $M'$  صورة  $M$  بالدوران  $R$  الذي مركزه  $C$  وزاويته  $\frac{\pi}{2}$

أ- بين أن  $z' = iz + 7 + i$

ب- تحقق من أن  $d$  لحق النقطة  $D$  صورة النقطة  $A$  بالدوران  $R$  هو  $3 + 5i$

ج- بين أن مجموعة النقط  $M$  ذات اللحق  $z$  بحيث  $|z - 4 - 4i| = |z - 3 - 5i|$  هي المستقيم  $(BC)$

## تمرين رقم 4

يحتوي صندوق على 5 بيدقتان بيضاوان و بيدقتان خضروان و بيدقة حمراء واحدة (لا يمكن التمييز بين البيدقات باللمس).  
نسحب عشوائيا بالتتابع و بإحلال ثلاث بيدقات من الصندوق .

1- ليكن  $A$  الحدث : «البيدقات الثلاث المسحوبة من نفس اللون» .

$$- \text{ بين أن } p(A) = \frac{17}{125}$$

2- ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البيدقات البيضاء المسحوبة .

- حدد قانون احتمال المتغير العشوائي  $X$  .

## تمرين رقم 5

I- لتكن  $g$  الدالة العددية المعرفة على  $]0, +\infty[$  بما يلي :  $g(x) = 1 - x + x \ln x$

أ- بين أن  $g'(x) = \ln x$  لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$

ب- بين أن الدالة  $g$  تناقصية على  $]0, 1[$  و تزايدية على  $]1, +\infty[$

2- أحسب  $g(1)$  و استنتج أن  $g(x) \geq 0$  لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$

II- نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]0, +\infty[$  بما يلي :  $f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$

و ليكن  $(C)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (الوحدة :  $1cm$ )

1- بين أن  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  و أول هندسيا النتيجة

(لحساب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  لاحظ أن  $f(x) = \frac{3x^2 - 1 - 2x \ln x}{x^2}$  لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$ )

2- بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$  و استنتج طبيعة الفرع اللانهائي للمنحنى  $(C)$  بجوار  $+\infty$

3- أ- بين أن  $f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$  لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$

ب- أول هندسيا النتيجة  $f'(1) = 0$

ج- بين أن الدالة  $f$  تزايدية على  $]0, +\infty[$

4- أنشئ ، في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ، المنحنى  $(C)$  (نقبل أن للمنحنى  $(C)$  نقطتي انعطاف أفصول إحداهما 1 و أفصول

الأخرى محصور بين 2 و 2.5 و نأخذ  $(f(0,3) = 0)$

5- أ- بين أن  $\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$

ب- أحسب ، ب  $cm^2$  ، مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى  $(C)$  و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين معادلتاهما

$$x=e \text{ و } x=1$$

6- لتكن  $h$  الدالة العددية المعرفة على  $IR^*$  بما يلي :  $h(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln(x^2)}{|x|}$

أ- بين أن الدالة  $h$  زوجية و أن  $h(x) = f(x)$  لكل  $x$  من  $]0, +\infty[$

ب- أنشئ ، في نفس المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ، المنحنى  $(C)$  الممثل للدالة  $h$  .

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2015 - الدورة الاستدراكية -

الشعب (ة) أو المسلك: شعبة العلوم التجريبية بمسالكها

مادة الرياضيات

تمرين رقم 1

1- لنبين بالترجع أن:  $U_n < 5$  ;  $(\forall n \in \mathbb{N})$

من أجل  $n=0$  لدينا  $U_0=4$  و  $4 < 5$

إذن:  $U_n < 5$

نفترض أن  $U_n < 5$  ولنبين أن:  $U_{n+1} < 5$

لدينا:  $U_{n+1} - 5 = \frac{2}{5}U_n + 3 - 5$

$$= \frac{2}{5}U_n - 2$$

$$= \frac{2}{5}(U_n - 5)$$

وبما أن  $U_n - 5 < 0$  فإن  $U_n < 5$

ومنه  $U_{n+1} - 5 < 0$  أي  $U_{n+1} < 5$

وبالتالي:  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_n < 5$

2- \* التحقق من المتساوية:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_{n+1} - U_n = \frac{2}{5}U_n + 3 - U_n$$

$$= \left(\frac{2}{5} - 1\right)U_n + 3$$

$$= -\frac{3}{5}U_n + 3$$

$$= \frac{3}{5}(5 - U_n)$$

\* استنتاج:

نعلم أن  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_n < 5$

ومنه:  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 5 - U_n > 0$

إذن:  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_{n+1} - U_n > 0$

وهذا يعني أن المتتالية  $(U_n)_n$  تزايدية قطعاً.

3- بما أن المتتالية  $(U_n)_n$  تزايدية ومكبورة بالعدد 5، فإنها

متقاربة.

4- أ- \* لنبين أن  $(V_n)_n$  هندسية

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; V_{n+1} = 5 - U_{n+1}$$

$$= 5 - \frac{2}{5}U_n - 3$$

$$= 2 - \frac{2}{5}U_n$$

$$= \frac{2}{5}(5 - U_n)$$

$$V_{n+1} = \frac{2}{5}V_n$$

ومنه المتتالية  $(V_n)_n$  هندسية أساسها  $\frac{2}{5}$  وحدها الأول:

$$V_0 = 5 - U_0 = 5 - 4 = 1$$

\*  $V_n$  بدلالة  $n$ :

بما أن المتتالية  $(V_n)_n$  هندسية فإن:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; V_n = V_0 \cdot q^n$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; V_n = 1 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; V_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

ب- استنتاج:

لدينا:  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; V_n = 5 - U_n$

ومنه:  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$

نهاية  $(U_n)_n$ :

لدينا:  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$

وبما أن:  $\lim \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$

لأن:  $-1 < \frac{2}{5} < 1$

فإن:  $\lim U_n = 5$

تمرين رقم 2

1- لدينا: معادلة (S) هي:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$$

ومنه:

$$(x + 1)^2 - 1 + y^2 + (z - 1)^2 - 1 - 7 = 0$$

$$(x + 1)^2 + (y - 0)^2 + (z - 1)^2 = 3^2$$

ومنه مركز (S) هو النقطة  $\Omega(-1, 0, 1)$  و شعاعها هو

$$R=3$$

$$\begin{cases} x_H = -1 + 2 = 1 \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{إذن :} \\ H(1,0,0) \quad \text{أي :}$$

### تمرين رقم 3

1-أ- حل المعادلة :  $z^2 - 8z + 32 = 0$

لدينا :  $\Delta = 64 - 128 = -64$

ومنه :  $z_1 = \frac{8 + 8i}{2} = 4 + 4i$

و  $z_2 = \bar{z}_1 = 4 - 4i$

ومنه :  $S = \{4 - 4i, 4 + 4i\}$

ب- \* لدينا :  $a = 4 + 4i$

ومنه :  $|a| = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$

إذن :  $a = 4\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

$a = 4\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

إذن :  $a = \left[ 4\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right]$

\* استنتاج :  $a^{12} = \left[ 4\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right]^{12}$

$= \left[ (4\sqrt{2})^{12}; 12 \frac{\pi}{4} \right]$

$= [2^{30}; 3\pi] = [2^{30}; 3]$

$= 2^{30} (\cos \pi + i \sin \pi)$

$= -2^{30}$

إذن :  $a^{12} \in \mathbb{R}^-$

2-أ- لدينا :

$M' = R(M) \Leftrightarrow z' - c = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - c)$

$\Leftrightarrow z' - c = i(z - c)$

$\Leftrightarrow z' = iz - ic + c$

$\Leftrightarrow z' = iz + (1 - i)c$

$\Leftrightarrow z' = iz + (1 - i)(3 + 4i)$

$\Leftrightarrow z' = iz + 3 + 4i - 3i + 4$

$\Leftrightarrow z' = iz + 7 + i$

2-أ- حساب المسافة  $d(\Omega, (P)) = \frac{|2x_\Omega - z_\Omega - 2|}{\sqrt{4+1}}$

$$= \frac{|-2 - 1 - 2|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

ب- استنتاج :

لدينا :  $d(\Omega, (P)) = \sqrt{5}$  و  $R = 3$

وبما أن :  $\sqrt{5} < 3$  (لأن  $5 < 9$ )

فإن :  $d(\Omega, (P)) < R$

ومنه المستوى  $(P)$  يقطع الفلكة  $(S)$  وفق دائرة  $(\Gamma)$

3- ليكن شعاع الدائرة  $(\Gamma)$

نعلم أن :  $r = \sqrt{R^2 - d(\Omega, (P))^2}$

فإن :  $r = \sqrt{9 - 5} = 2$

\* إحداثيات  $H$  مركز الدائرة  $(\Gamma)$

لدينا  $H$  هي تقاطع المستوى  $(P)$  والمستقيم  $(\Delta)$  المار من

$\Omega$  و العمودي على المستوى  $(P)$  (لأن  $H$  هي المسقط العمودي

ل  $\Omega$  على  $(P)$ )

لدينا  $(\Delta) \perp (P)$  إذن  $(\Delta)$  موجه بالمتجه  $\vec{n}_P(2, 0, -1)$

المنظمية على  $(P)$

ومنه تمثيل بارامترى لـ  $(\Delta)$  هو النظمة

$$\begin{cases} x = -1 + 2k \\ y = 0 \\ z = 1 - k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$$

$H \in (P) \Leftrightarrow 2x_H - z_H - 2 = 0$  (1)

$H \in (\Delta) \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2k \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - k \end{cases}$

نعوض  $x_H$  و  $y_H$  و  $z_H$  في (1) نجد :

$-2(1 + 2k) - (1 - k) - 2 = 0$

$\Leftrightarrow -2 + 4k - 1 + k - 2 = 0$

$\Leftrightarrow 5k = 5$

$\Leftrightarrow k = 1$

إذن المجموعة المطلوبة هي المستقيم  $(\Delta)$  الذي معادلته هي :

$$x - y + 1 = 0$$

وبما أن  $C \in (\Delta)$  و  $B \in (\Delta)$

(نتحقق من ذلك بالأحداثيات)

فإن :  $(\Delta) = (BC)$

#### تمرين رقم 4

ليكن  $\Omega$  كون الإمكانات

بما أن السحب بتتابع وبإحلال

فإن كل سحبة هي ترتيبية بتكرار .

ومنه :  $Card\Omega = 5^3 = 125$

1- احتمال الحدث  $A$  :

لدينا :  $A = \{BBB; VVV; RRR\}$

ومنه :  $CardA = 2^3 + 2^3 + 1^3$

$= 17$  إذن :

$$p(A) = \frac{CardA}{Card\Omega} = \frac{17}{125}$$

2- \* قيم  $X$  :

قيمة $X$	نوع السحبات
0	$\bar{B} \bar{B} \bar{B}$
1	$\bar{B} \bar{B} B$
2	$\bar{B} B B$
3	$B B B$

ومنه  $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$

\* قانون احتمال  $X$  :

$$p(X = 0) = \frac{3^3}{125} = \frac{27}{125}$$

$$p(X = 1) = \frac{3 \cdot 2^1 \cdot 3^2}{125} = \frac{54}{125}$$

$$p(X = 2) = \frac{3 \cdot 2^2 \cdot 3^1}{125} = \frac{36}{125}$$

$$p(X = 3) = \frac{2^3}{125} = \frac{8}{125}$$

نتحقق بسرعة أن :

$$p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) = 1$$

ب- لدينا  $D$  صورة  $A$  بالدوران  $R$

إذن :  $D = R(A) \Leftrightarrow d = ia + 7 + i$

$$\Leftrightarrow d = i(4 + 4i) + 7 + i$$

$$\Leftrightarrow d = 4i - 4 + 7 + i$$

$$\Leftrightarrow d = 3 + 5i$$

ج- طريقة (1) :

$$|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i|$$

$$\Leftrightarrow |z - (3 + 5i)| = |z - (4 + 4i)|$$

$$\Leftrightarrow |z_M - z_D| = |z_M - z_A|$$

$$\Leftrightarrow DM = AM$$

إذن المجموعة المطلوبة هي واسط القطعة  $[AD]$

بما أن المثلث  $ACD$  قائم الزاوية ومتساوي الساقين في  $C$

(لأن  $R(A) = D$ )

فإن واسط القطعة  $[AD]$  يمر من  $C$

وبما أن :  $AB = |b - a| = |-2 - i| = \sqrt{5}$

$$DB = |b - d| = |-1 - 2i| = \sqrt{5}$$

أي :  $AB = DB$

فإن واسط القطعة  $[AD]$  يمر أيضا من  $B$  .

إذن واسط القطعة  $[AD]$  هو المستقيم  $(BC)$  .

طريقة (2) :

نضع :  $(x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}) z = x + iy$

ومنه :  $|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i|$

$$\Leftrightarrow |x + iy - 3 - 5i| = |x + iy - 4 - 4i|$$

$$\Leftrightarrow |(x - 3) + i(y - 5)| = |(x - 4) + i(y - 4)|$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 5)^2} = \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 4)^2}$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y - 5)^2 = (x - 4)^2 + (y - 4)^2$$

$$\Leftrightarrow -6x + 9 - 10y + 25 = -8x + 16 - 8y + 16$$

$$\Leftrightarrow 2x - 2y + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x - y + 1 = 0$$

$$\forall x \in ]0, +\infty[;$$

لدينا :

$$f'(x) = \left(3 - \frac{1}{x^2} - 2\frac{\ln x}{x}\right)'$$

$$= \frac{2x}{x^4} - 2\frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$= \frac{2}{x^3} - 2\left(\frac{1 - \ln x}{x^2}\right)$$

$$= \frac{2}{x^3}(1 - x + x \ln x)$$

$$= \frac{2}{x^3} g(x)$$

$$f'(1) = \frac{2}{1^3} \cdot g(1) = 0 \quad \text{ب-}$$

ومنه (C) يقبل مماسا أفقيا في النقطة التي أفصولها 1.

$$\text{ج- لدينا : } \forall x \in ]0; +\infty[ ; f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$$

$$\text{وبما أن } \frac{2}{x^3} > 0 \text{ و } g(x) \geq 0$$


لكل  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$

$$\forall x \in ]0; +\infty[ ; f'(x) \geq 0$$

إذن  $f$  تزايدية على  $]0; +\infty[$

4- إنشاء (C) : - جدول تغيرات  $f$  هو :

$x$		1		$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+	
$f(x)$	$-\infty$			3



$$\text{I- } \forall x \in ]0, +\infty[ ; g'(x) = (1 - x + x \ln x)'$$

$$g'(x) = -1 + (1 + \ln x)$$

$$= \ln x$$

ب- إشارة  $g'(x)$  هي إشارة  $\ln x$

$$\forall x \in ]0, 1] ; \ln(x) \leq 0$$

$$\forall x \in ]0, 1] ; g'(x) \leq 0$$

إذن  $g$  تناقصية على المجال  $]0, 1]$

$$\forall x \in [1, +\infty[ ; \ln(x) \geq 0$$

$$\forall x \in [1, +\infty[ ; g'(x) \geq 0$$

إذن  $g$  تزايدية على المجال  $[1; +\infty[$

$$g(1) = 1 - 1 + 1 \ln 1 = 0 \quad \text{* - 2}$$

\* لدينا  $g$  تقبل قيمة دنيا هي  $g(1)$  على  $]0; +\infty[$

$$\forall x \in ]0, +\infty[ ; g(x) \geq g(1)$$

$$\forall x \in ]0, +\infty[ ; g(x) \geq 0$$

II-

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 3 - \frac{1}{x^2} - 2\frac{\ln x}{x} \quad \text{* - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} 3 - \frac{1}{x^2}(1 + 2x \ln x)$$

$$= -\infty$$

$$\left( \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x^2} = -\infty \quad \text{لأن} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 + 2x \ln x = 1 \quad \text{و} \end{array} \right)$$

\* هندسيا :

(C) يقبل مقاربا عموديا معادلته  $x=0$

$$\text{2- لدينا : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 - \frac{1}{x^2} - 2\frac{\ln x}{x} = 3$$

$$\left( \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{array} \right) \text{ لأن :}$$

هندسيا (C) يقبل مقاربا أفقيا معادلته  $y=3$  بجوار  $+\infty$

3- أ- لنبين أن :

$$\forall x \in ]0; +\infty[ ; f(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$$

5-أ- لتبين أن

$$\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$$

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{2 \ln(x)}{x} dx &= 2 \int_1^e \frac{1}{x} \ln x dx \\ &= 2 \ln'(x) \cdot (\ln x)^1 dx \\ &= [\ln^2(x)]_1^e \\ &= \ln^2(e) - \ln^2(1) = 1 \end{aligned}$$

ب- المساحة المطلوبة هي :

$$A = \int_1^e |f(x)| dx \text{ (ua)}$$

$$\forall x \in [1, e] ; f(x) > 0$$

وبما أن

$$A = \int_1^e f(x) dx \text{ (ua)}$$

فإن :

$$= \int_1^e \left( 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right) dx \text{ (ua)}$$

$$= \left( \int_1^e \left( 3 - \frac{1}{x^2} \right) dx - \int_1^e \left( \frac{2 \ln x}{x} \right) dx \right) \text{ (ua)}$$

$$A = \left( \left[ 3x + \frac{1}{x} \right]_1^e - 2 \right) \text{ (ua)}$$

$$= \left( 3e + \frac{1}{e} - 4 - 2 \right) \text{ (ua)}$$

$$= \left( \frac{3e^2 + 1 - 6e}{e} \right) \text{cm}^2$$

6-أ- لتبين أن الدالة  $h$  زوجية .

لدينا : لكل من  $IR^*$  ,  $-x$  ينتمي إلى  $IR^*$

$$\text{ولدينا : } h(-x) = 3 - \frac{1}{(-x)^2} - \frac{\ln((-x)^2)}{|-x|}$$

$$= 3 - \frac{1}{-x^2} - \frac{\ln x^2}{|x|}$$

$$= h(x)$$

ومنه المطلوب .

\* لكل  $x$  من  $IR^{*+}$  لدينا  $|x| = x$

$$\text{و } \ln(x^2) = 2 \ln x$$

$$\text{إذن } h(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$$

$$= f(x)$$

ب- إنشاء  $(C')$  منحنى  $h$

لدينا :  $\forall x \in ]0, +\infty[ ; h(x) = f(x)$

ومنه  $(C')$  هو  $(C)$  على المجال  $]0, +\infty[$ .

و  $h$  زوجية ، إذن  $(C')$  متماثل بالنسبة لمحور الأرتاب .

إنشاء  $(C')$  انظر الشكل .