



الصفحة: 1/1	<b>الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي</b> <b>دورة يونيو 2017</b>
ساعتان مدة الإجاز:	<b>التعليم العام و التعليم الأصيل (المترشحون الرسميون و الأحرار)</b>
المعامل: 3	<b>المادة : الرياضيات</b> <b>عنصر الاحياء + سائمه التتفطيط</b>

<p><b>التمرين الأول (5 ن) :</b></p> <p>( نأخذ بعين الاعتبار للطريقة المتبعة )</p> <p>1) 1 ن للحل 2) 0,5 ن لكل حل 3) 1 ن 4) 0,5 لكل حل <b>ب) 0,5 للتبييض + 0,25 لكل حل</b></p>	1 1 1 1 1
<p><b>التمرين الثاني (2 ن) :</b></p> <p>(1) 0,5 ن لكل إنشاء (2) 1 ن</p>	1 1
<p><b>التمرين الثالث (4 ن) :</b></p> <p>(1) 0,5 لكل جواب صحيح (2) 0,5 ن (3) 1ن لحساب المسافتين + 0,5 ن للاستنتاج (4) 1 ن</p>	1 0,5 1,5 1
<p><b>التمرين الرابع (3,25 ن) :</b></p> <p>(1) 0,5 ن للتحقق (2) 0,5 ن لحساب <math>f</math>. (3) 0,5 ن لحساب <math>g</math>. (4) 0,5 ن لكل إنشاء مستقيم و 0,25 ن للحل المبغي</p>	0,5 0,5 0,5 1,25
<p><b>التمرين الخامس (2,75):</b></p> <p>(1) 0,25 ن لكل حصص متراكمة (<math>7 \times 0,25</math>) (2) 0,5 ن (3) 0,5 ن</p>	1,75 0,5 0,5
<p><b>التمرين السادس (3 ن):</b></p> <p>(1) 1 ن لحساب الحجم (2) 0,5 ن لحساب المسافة (3) 1 ن (4) 0,5 ن للاستنتاج</p>	1 0,5 1 0,5



الصفحة:	امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي	
1/2	نورة يونيو 2017	
ساعتان	مدة الإنجاز:	التعليم العام و التعليم الأصيل (المترشحون الرسميون والأحرار)
المعامل: 3	المادة : الرياضيات	

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير قابلة للبرمجة

التمرين الأول (5 ن) :		
(1) ليكن $x$ عدداً حقيقياً؛ حل المعادلة : $2x - 5 = 3(x - 5)$	1	
(2) ليكن $x$ عدداً حقيقياً؛ حل المعادلة : $(2x + 1)(x - \sqrt{2}) + 3(x - \sqrt{2}) = 0$	1	
(3) ليكن $x$ عدداً حقيقياً؛ حل المتراجحة : $3x + 2 < 4x - 5$	1	
(4) (أ) ليكن $x$ و $y$ عددين حقيقيين؛ حل النظمتين التاليتين :	1	
$\begin{cases} x + y = 400 \\ 3x + 2y = 985 \end{cases}$	1	
(ب) تحتوي قاعة مسرح على صنفين من المقاعد، ثمن تذكرة أحد الصنفين هو 15 درهماً و ثمن تذكرة الصنف الآخر هو 10 درهماً. إذا علمت أن القاعة تحتوي على 400 مقعداً وأن المدخول الإجمالي عند الامتلاء الكلي للقاعة هو 4925 دراماً فكم يساوي عدد مقاعد كل صنف؟	1	
التمرين الثاني (2 ن) :		
ليكن $ABC$ مثلثاً متساوياً الساقين رأسه $A$ و النقطة $M$ منتصف القطعة $[BC]$ ؛ ولتكن $T$ الإزاحة التي تحول $A$ إلى $M$ .	1	
(1) أنشيء النقطتين $B'$ و $C'$ صورتي النقطتين $B$ و $C$ على التوالي بالإزاحة $T$	1	
(2) بين أن المثلث $B'MC'$ متساوي الساقين رأسه $M$ .	1	
التمرين الثالث (4 ن) :		
المستوى منسوب إلى معلم متعادم منظم $(O; I, J)$ ؛ نعتبر المستقيم $(D)$ الذي معادلته المختصرة $y = -x + 3$ و النقط $A(2; 5)$ و $B(1; 2)$ و $C(-1; 4)$ و $M(0; 3)$ .	1	
(1) تتحقق أن النقطة $B$ تنتمي إلى المستقيم $(D)$ و أن النقطة $A$ لا تنتمي إلى المستقيم $(D)$	0,5	
(2) بين أن النقطة $M$ هي منتصف القطعة $[BC]$	1,5	
(3) أحسب المسافتين $AB$ و $AC$ و استنتج أن المثلث $ABC$ متساوي الساقين رأسه $A$	1	
(4) أكتب المعادلة المختصرة للمستقيم $(\Delta)$ العمودي على المستقيم $(D)$ و المار من $M$ .	1	
التمرين الرابع (3,25 ن) :		
المستوى منسوب إلى معلم متعادم منظم $(O; I, J)$ . (1) لتكن $f$ دالة خطية حيث : $f(-2) = 6$ أ) تتحقق أن صيغة $f$ هي : $f(x) = -3x$ ب) أحسب $f(2)$ .	0,5	
(2) نعتبر الدالة التالية $g$ حيث : $g(x) = 2x - 5$ أ) أحسب $g(2)$ ب) حدد قيمة العدد $a$ إذا علمت أن النقطة $A(a + 2, a^2)$ تنتمي إلى مبيان الدالة $g$ .	0,5	
(3) ليكن $x$ عدداً حقيقياً، حل مبياناً $f(x) = g(x)$	1,25	



2/2

التمرين الخامس ( 2,75 ن ) :  
الجدول التالي يعطينا كشفا عن نقط 30 تلميذا في مادة الرياضيات

النقطة	17	15	13	11	9	7	3	عدد التلاميذ / الحصص
الحصص المتراكمة								
1	3	2	6	5	7	5	2	

- 1) أتمم الجدول ؛
- 2) حدد القيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية المدروسة ؛
- 3) أحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة .

1,75  
0,5  
0,5

التمرين السادس ( 3 ن ) :  
في الشكل جانبه ، ( طول الوحدة بالسنتيمتر ) :  $SABCD$  هرم منتظم رأسه  $S$  و قاعده المربع  $ABCD$  الذي مرکزه النقطة  $O$  حيث :  $BC = 4\text{cm}$  و الارتفاع  $SO$  يساوي  $6\text{cm}$ .

- 1) بين أن حجم الهرم  $SABCD$  يساوي  $32 \text{ cm}^3$
- 2) أحسب المسافة  $SA$

- 3) نعتبر المستوى ( $NPR$ ) الموازي للمستوى ( $BCD$ )  
 $SM = \frac{1}{3}SA$  حيث :

(النقطة  $M$  تنتمي إلى  $[SA]$  )

نحصل على الهرم  $SMNPR$  كتصغير للهرم  $SABCD$

بين أن :  $MN = \frac{1}{3}AB$

- 4) استنتاج حجم الهرم  $.SMNPR$

1  
0,5  
1  
0,5

