

تمرين في التربية

من بين العوامل التي تؤثر على حياة النباتات ، الخصائص المائية للتربة.

لتحديد طبيعة العلاقة المرجونة بين الخصائص المائية للتربة و قد حبيباتها، أجريت دراسات على 5 أنواع من التربة، وقد جمعت النتائج في الجدول 1:

(1) استخرج من الجدول 1 العلاقة بين قد حبيبات التربة و قدرتها على الاحتفاظ بالماء؟

طين	طمي	طمي رملي	رمل نفيع	رمل غليظ	نوع التربة	الجدول 1
أقل من 2 μm	من 20 μm إلى 2 μm	من 50 μm إلى 20 μm	من 200 μm إلى 50 μm	من 2 mm إلى 200 μm	قطر الحبيبات	
27,4	18,9	12	5,5	1,55	قدرة الاحتفاظ بالماء (%)	

تقدر نقطة النبول بـ نسبة الماء الموجود بالتربيه عندما تبدأ النباتات بالنبول. و يعطي الجدول 2 نقطة نبول بعض النباتات في أنواع مختلفة من التربة.

نقطة النبول بـ % في التربة					الجدول 2
طين	طمي	طمي رملي	رمل نفيع	رمل غليظ	النباتات
15,5	9,9	6,5	3,1	1,07	فمح
15,3	11,7	6,9	3,3	1,11	طماطم
16,6	12,7	6,9	3,3	1,02	جلبة
13	10,5	5,6	2,7	0,96	ارز

(2) كيف تفسر نبول النباتات رغم وجود نسبة معينة من الماء في التربة ؟

(3) استخرج من الجدول 2 العلاقة بين نقطة النبول و قوام التربة.

4) حدد معللاً جوابك نسبة الماء القابل للامتصاص من طرف الأرز في كل نوع من التربة.


5) علماً أن نمو نبات الأرز يتطلب نسبة عالية من الماء القابل للامتصاص، حدد نوعية التربة التي يمكن زراعة هذا النبات عليها.

لاختبار مدى إمكانية زراعة نبات الأرز في أحد الحقول، أنجز التحليل الحبيبي لترية هذا الحقل. وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:

10% حبيبات الطين + 20% حبيبات الطمي

42% حبيبات الرمل الدقيق + 28% حبيبات الرمل الخشن

6) اعتماداً على المعطيات السابقة و على مثلاً قوام التربة المعين في الوثيقة 1، بين إن كانت التربة المدروسة مناسبة لزراعة نبات الأرز.



تصحيح التمرين 2 في التربة

- 1- من الرمل الغليظ إلى الطين يتناقص قد الحبيبات و تتزايد القدرة على الاحتفاظ بالماء ، و بالتالي فكلما صغر قد حبيبات التربة كلما ارتفعت قدرتها على الاحتفاظ بالماء .
- 2- عند نقطة الذبول تبدأ النسبة بالذبول رغم وجود نسبة من الماء في التربة لأن النسبة تصبح عاجزة عن امتصاصها من التربة (تصبح قدرة تمك المسام الدقيقة في التربة بالماء أكبر من قدرة النسبة على الامتصاص) .
- 3- عند مختلف الأنواع النباتية المدروسة تزداد قيمة نقطة الذبول مع انخفاض قد حبيبات التربة أي انخفاض قوام التربة ، و بالتالي فكلما كان قوام التربة صغير كلما كبرت نقطة الذبول .
- 4- نسبة الماء القابل للامتصاص من طرف الأرز هو نسبة الماء المشبعة للتربة (100 %) ناقص الماء الغير قابل للامتصاص أي الماء الوجود في التربة عند نقطة الذبول (= نقطة الذبول - 100 %) ، و بالتالي :


طين	طمي	طمي رملي	رمل دقيق	رمل غليظ	نسبة الماء الممتصة من طرف الأرز
% 87	% 89.5	% 94.4	% 97.3	% 99.04	

- 5- بما أن نمو نبتة الأرز يتطلب كمية مرتفعة من الماء القابل للامتصاص ، فإن التربة التي يمكن زراعتها عليها هي التربة ذات القوام الرملي .
- 6- لمعرفة هل التربة مناسبة لزراعة الأرز ، يجب أولا استعمال مثلث قوام التربة لتحديد قوامها انطلاقاً من نسب مكوناتها ، تضم التربة :

$$10 \% \text{ طين} + 20 \% \text{ طمي} + 70 \% \text{ رمل}$$

بإسقاط هذه المكونات على مثلث قوام التربة نحصل على النتيجة التالية :

الوثيقة 1



الترابة المعنية قوامها عبارة عن طمي رملي و بالتالي فهي غير صالحة لزراعة الأرز .