

I. مفهوم دالة عددية

تعريف: ليكن D جزءا من \mathbb{R} . نسمي f دالة عددية معرفة على D (أو f دالة من D نحو \mathbb{R})، كل علاقة تربط كل عنصر x من D بعنصر وحيد من \mathbb{R} ، يرمز له بالرمز $f(x)$.

مثال: نعتبر الدالة العددية f المعرفة كالتالي: $f(x) = -2x$
أنقل و أتمم الجدول التالي:

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|----|---|--------|
| | | $\frac{5}{2}$ | | | 1 | x |
| 13 | $\frac{2}{7}$ | | -1 | -6 | | $f(x)$ |

II. مجموعة تعريف دوال عددية:**تعريف:**

لتكن f دالة عددية لمتغير حقيقي x . مجموعة تعريف الدالة f هي المجموعة المكونة من جميع الأعداد الحقيقية x بحيث $f(x)$ موجود أي $f(x)$ قابلة للحساب. و يرمز لها غالبا بالرمز D_f بمعنى: $x \in D_f \Leftrightarrow f(x) \in \mathbb{R}$.

ملحوظة: نقول إن f دالة عددية معرفة على A إذا كان A جزءا من D_f .

اصطلاحات: لتكن f دالة عددية معرفة على D نكتب: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow f(x)$$

- المجموعة D تسمى مجموعة تعريف الدالة f .
- ليكن x عنصرا من D ، بحيث: $y = f(x)$
← y يسمى صورة x بالدالة f .
- ← العنصر x يسمى سابق العنصر y .
- الدالة f تسمى كذلك دالة عددية لمتغير حقيقي.
- المستوى المنسوب إلى معلم $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j})$ غالبا يكون متعامدا منظمًا.

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي: $f(x) = \frac{2x}{4x^2 - 1}$

حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f

III. التمثيل المبياني لدالة عددية:**تعريف:**

لتكن f دالة عددية معرفة على جزء D من \mathbb{R} . التمثيل المبياني C_f للدالة f (أو منحنى الدالة f) هو مجموعة النقط $M(x; y)$ من المستوى بحيث:

- الأفصول x يتغير في مجموعة التعريف D .
- الأرتوب y هو صورة x بالدالة f .

بمعنى $x \in D$ و $y = f(x)$.

هذا التعريف يعني: إذا كان $M(x, y) \in C_f$ فإن $x \in D$ و $y = f(x)$.
 إذا كان $x \in D$ و $y = f(x)$ فإن $M(x, y) \in C_f$.
 العلاقة $y = f(x)$ تسمى معادلة ديكراتية للمنحنى C_f في المعلم $(o; \vec{i}; \vec{j})$.
 مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي: $f(x) = x^2$

أرسم التمثيل المبياني للدالة f .

IV. الدالة الزوجية- الدالة الفردية:

أ) الدالة الزوجية:

تعريف: لنكن f دالة عددية لمتغير حقيقي x و D_f مجموعة تعريفها.

نقول إن f دالة زوجية إذا تحقق الشرطان التاليان:

❖ لكل x من D_f لدينا: $-x$ تنتمي إلى D_f .

❖ لكل x من D_f لدينا: $f(-x) = f(x)$

خاصية: (التأويل المبياني لدالة زوجية)

لنكن f دالة عددية لمتغير x حقيقي و C_f منحناها في معلم متعامد ممنظم $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

تكون f دالة زوجية إذا و فقط إذا كان محور الأرتيب محور تماثل المنحنى C_f .

ملاحظة: إذا كانت f دالة زوجية (على التوالي فردية) فإنه يكفي إنشاء C_f على $\mathbb{R}^+ \cap D_f$ و بالتماثل بالنسبة لمحور الأرتيب (على التوالي بالنسبة لأصل المعلم) نحصل على المنحنى C_f بكامله.

ب) الدالة الفردية:

لنكن f دالة عددية لمتغير حقيقي x و C_f منحناها في معلم متعامد ممنظم $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

تعريف:

لنكن f دالة عددية لمتغير حقيقي x و D_f مجموعة تعريفها

نقول أن f دالة فردية إذا تحقق الشرطان التاليان:

❖ لكل x من D_f لدينا: $-x$ تنتمي إلى D_f .

❖ لكل x من D_f لدينا: $f(-x) = -f(x)$

خاصية: (التأويل المبياني لدالة فردية)

لنكن f دالة عددية لمتغير حقيقي و C_f منحناها في معلم متعامد ممنظم $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

تكون f دالة فردية إذا و فقط إذا كانت النقطة 0 مركز تماثل المنحنى C_f .

V. تغيرات دالة عددية:

1. تعريف:

لنكن f دالة عددية معرفة على المجال I .

❖ نقول إن الدالة f تزايدية قطعاً (تناقصية قطعاً) على المجال I , إذا و فقط إذا كان لكل $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) < f(x_2)$

$$(f(x_1) > f(x_2))$$

❖ نقول إن الدالة f ثابتة على المجال I , إذا و فقط إذا كان لكل x_1 و x_2 من I لدينا: $f(x_1) = f(x_2)$

2. جدول تغيرات دالة:

لنكن f دالة عددية لمتغير حقيقي x و D_f مجموعة تعريفها.

دراسة منحنى تغيرات الدالة f , يعني تجزئ المجموعة D_f إلى أكبر مجالات ممكنة تكون فيها الدالة f تزايدية أو تناقصية قطعاً أو ثابتة.

و نلخص نتائج هذه الدراسة في جدول, يسمى جدول تغيرات الدالة f , بحيث السهم (تصاعدي) يعني أن f تزايدية قطعاً, و السهم

(تنازلي) يعني أن تناقصية f قطعاً, و السهم (أفقي) يعني أن f ثابتة. →

3. رتابة دالة f على مجال:

لكل x من $-x$ تنتمي
إلى D_f يعني أن D_f متماثل
بالنسبة للعدد 0.

تعريف:

لتكن دالة عددية معرفة على مجال I .
نقول إن f رتيبة قطعا على المجال I إذا كانت تزايدية قطعا على I أو تناقصية قطعا على I .

VI. دراسة بعض الدوال الاعتيادية

الدالة: $x \mapsto ax + b$ ($a \neq 0$)

مثال 1: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي: $f(x) = 2x + 1$

أرسم التمثيل المبياني للدالة f .

ملاحظة: التمثيل المبياني للدالة f هو مستقيم

مثال 2: $f(x) = 4x$

و تحديد جدول التغيرات.

الدالة: $x \mapsto ax^2$ ($a \neq 0$)

ليكن a عددا حقيقيا غير منعدم.

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي: $f(x) = ax^2$ و (P) تمثيلها المبياني في معلم متعامد منظم.

زوجية الدالة f :

ليكن $x \in \mathbb{R}$: لدينا $f(-x) = a(-x)^2 = ax^2 = f(x)$, إذن $f(-x) = f(x)$ و منه f دالة زوجية.

تغيرات f :

خاصية:

▪ إذا كانت $a > 0$: الدالة f تزايدية قطعا على $[0, +\infty[$ و تناقصية قطعا على $]-\infty, 0]$.

▪ إذا كانت $a < 0$: الدالة f تناقصية قطعا على $[0, +\infty[$ و تزايدية قطعا على $]-\infty, 0]$.

الحالة: $a < 0$

الحالة: $a > 0$

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $-\infty$ |
| f | | 0 | |

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $-\infty$ |
| f | | 0 | |

كل منحنى يقبل معادلة على شكل $Y = aX^2$ حيث $a \neq 0$ في معلم $(\vec{j}; \vec{i}; \Omega)$ يسمى شلجما رأسه Ω و محور تماثله هو محور الأرتايب (ΩY) .

حالة: $a < 0$


التمثيل المبياني للدالة f :

بما أن f دالة زوجية فانه يكفي أن نمثلها على \mathbb{R}^+ .
ثم نتم المنحنى (P) باستعمال التماثل المحوري بالنسبة لمحور الأرتايب.

تعريف: المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto ax^2$ ($a \neq 0$) يسمى شلجما.

النقطة أصل المعلم تسمى رأس الشلجم.

حالة: $a > 0$



الدالة: $(a \neq 0) x \mapsto \frac{a}{x}$

ليكن a عددا حقيقيا غير منعدم

f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة بما يلي: $f(x) \mapsto \frac{a}{x}$ و (H) التمثيل المبياني للدالة f في معلم متعامد $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

مجموعة التعريف: مجموعة تعريف الدالة f هي: $D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$

زوجية الدالة f : ليكن $x \in D_f$, لدينا $-x \in D_f$ و $f(-x) = f(x)$ إذن f دالة فردية.

تغيرات f :

خاصية:

▪ إذا كان $a > 0$ فإن الدالة f تناقصية قطاعا على كل من المجالين $]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$.

▪ إذا كان $a < 0$ فإن الدالة f تزايدية قطاعا على كل من المجالين $]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$.

الحالة: $a < 0$

الحالة: $a > 0$

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| f | ↗ | | ↗ |

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| f | ↘ | | ↘ |

التمثيل المبياني للدالة f :



بما أن f دالة فردية فإنه يكفي أن نمثل f على $]0, +\infty[$, ثم نتم منحى الدالة f على باستعمال التماثل المركزي الذي مركزه O أصل المعلم.

تعريف:

منحنى الدالة $(a \neq 0) x \mapsto \frac{a}{x}$ يسمى هذلوليا مركزه O أصل المعلم و مستقيماه المقاربان هما $x = 0$ و $y = 0$.

الحالة: $a < 0$

حالة: $a > 0$



مثال 1: دراسة و تمثيل الدالة f المعرفة ب: $f(x) = \frac{2}{x}$

مثال 2: دراسة و تمثيل الدالة f المعرفة ب: $f(x) = \frac{-3}{x}$

التمثيل المبياني و تغيرات الدالة: $x \mapsto ax^2 + bx + c$

مثال: نعتبر الدالة العددية f المعرفة كالتالي: $f(x) = 2x^2 + 4x - 2$

1. أنقل و أتمم الجدول التالي:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|---|---|--------|
| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | x |
| | | | | | | | $f(x)$ |

2. أرسم التمثيل المبياني للدالة f .
ملاحظة: التمثيل المبياني للدالة f يسمى شلجما رأسه $S(-1;0)$ و محوره $x = -1$: (D) .