

محتوى الدرس

المعلم في المستوى :
إحداثيات نقطة ، إحداثيات منتصف قطعة ، المسافة بين نقطتين
المعلم ، المعلم المتعمد ، المعلم المتعامد المنظم.

الأهداف القرارات المنظرة من الدرس :

تمثيل نقطة إحداثياتها معلومتان
على التلميذ أن يكون قادرًا على تحديد إحداثيات نقطة وتجهيز وحساب إحداثيات منتصف قطعة و المسافة بين نقطتين.

3. إحداثيات متوجهة :

خاصية: ليكن (O, \vec{i}, \vec{j}) معلم.

إذا كانت $B(x_B, y_B)$ و $A(x_A, y_A)$ فان:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$$

في الكتابة (x_A, y_A) هو A أقصول x_A . y_A هو أرتوب A .

مثال:

إذا كانت $B(-3, 7)$ و $A(1, -4)$


فإن $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$ أي

أن $(-4, 11) - (-3, 7) = (-1, 3)$ و بالتالي:

4. إحداثيات منتصف قطعة:

خاصية: إذا كانت $B(x_B, y_B)$ و $A(x_A, y_A)$

و $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ فان: M منتصف القطعة $[AB]$



مثال: حدد زوج إحداثيات M منتصف القطعة $[AB]$

$B(-1, 2)$ و $A(3, 1)$

الجواب: $I\left(1; \frac{3}{2}\right)$ يعني $I\left(\frac{3-1}{2}; \frac{2+1}{2}\right)$

1. المعلم في المستوى:

إذا كانت O و I و J ثلات نقاط غير مستقيمية فان المثلث $(O, \overline{OI}, \overline{OJ})$ يسمى معلمًا للمستوى.

ترميز: عادة نضع \vec{i} و \vec{j} $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$ و $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$

فيصبح لدينا: (O, \vec{i}, \vec{j}) معلم للمستوى.

2. إحداثيات نقطة:

نشاط: أرسم في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) النقطة التالية: $A(2, 3)$ و

$B(4, -1)$

حدد باستعمال الشكل احداثيات M منتصف القطعة $[AB]$

تعريف: ليكن (O, \vec{i}, \vec{j}) معلمًا

لكل نقطة M من المستوى يوجد زوج وحيد (x, y)

بحيث: $\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}$

الزوج (x, y) هو إحداثيات النقطة M في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) و

نكتب $M(x, y)$


خاصية: ليكن (O, \vec{i}, \vec{j}) معلمًا. (x, y) تكافئ \overrightarrow{OM} بمعنى x

يسمى أقصول النقطة M

y يسمى أرتوب النقطة M

(OI) يسمى محور الأفاصيل

(OJ) يسمى محور الأراتيب.



5. المسافة بين نقطتين:

ليكن $O(\vec{i}, \vec{j})$ معلم متعامداً منظماً. إذا كانت $B(x_B, y_B)$ و $A(x_A, y_A)$ فان: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ هي المسافة بين النقطتين (A, B) في معلم متعامد منظم.

$$AB = \sqrt{(-1-3)^2 + (2-1)^2} \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

تمرين 1: في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم $(o; \vec{i}, \vec{j})$

نعتبر النقط: $C(3, -2), A(1, 2), B(-3, -1)$

1. حدد زوج إحداثي I منتصف $[AB]$

2. أحسب المسافات التالية: BC و AC و AB .

$$I\left(-1; \frac{1}{2}\right) \text{ يعني } I\left(\frac{1-3}{2}; \frac{2-1}{2}\right) \text{ يعني } I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-3-1)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5 \quad (2)$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(3+3)^2 + (-2+1)^2} = \sqrt{36+1} = \sqrt{37}$$

تمرين 2: نعتبر في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم النقط التالية:

$$C(0, 1+\sqrt{3}), B(1, 1), A(-1, 1)$$

1. حدد \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{AB} .

2. احسب: BC , AC , AB .

3. استنتج طبيعة المثلث (ABC) .

4. حدد إحداثيات I منتصف القطعة $[AB]$.

الأجوبة:

$$\overrightarrow{AB}(1+1, 1-1) \text{ أي أن } \overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A) = (1, 0)$$

و بالتالي: $\overrightarrow{AB}(2, 0)$

$$\overrightarrow{AC}(0+1, 1+\sqrt{3}-1) \text{ أي أن } \overrightarrow{AC}(x_C - x_A, y_C - y_A) = (1, \sqrt{3})$$

و بالتالي: $\overrightarrow{AC}(1, \sqrt{3})$

$$\overrightarrow{BC}(0-1, 1+\sqrt{3}-1) \text{ أي أن } \overrightarrow{BC}(x_C - x_B, y_C - y_B) = (-1, \sqrt{3})$$

و بالتالي: $\overrightarrow{BC}(-1, \sqrt{3})$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(1+1)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{4+0} = \sqrt{4} = 2 \quad (2)$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

ومنه المثلث ABC متساوي الأضلاع لأن:

$$AB = AC = BC$$

$$I(0; 1) \text{ يعني } I\left(\frac{-1+1}{2}; \frac{1+1}{2}\right) \text{ يعني } I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) = (0; 1)$$