

## المستقيم في المستوى

### محددة متجهتين


محددة متجهتين  $\vec{u}(x, y)$  و  $\vec{v}(x', y')$  هو العدد الحقيقي  $\det(\vec{u}, \vec{v})$  المعروف بما يلي :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$$

### شرط استقامية متجهتين

❖  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مستقيمتان إذا وفقط إذا كان  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$   
❖  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  غير مستقيمتين إذا وفقط إذا كان  $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$

### المستقيم في المستوى



لتكن  $A$  نقطة من المستوى و  $\vec{v}$  متجهة غير منعدمة .  
مجموعة النقط  $M$  التي تحقق  $\overrightarrow{AM} = k\vec{v}$  بحيث  $k \in \mathbb{R}$  ، هي المستقيم المار من النقطة  $A$  و الموجه بالمتجهة  $\vec{v}$  و  
نرمز له ب  $D(A, \vec{v})$

### تمثيل بارامتري لمستقيم

المستوى  $\mathcal{P}$  منسوب إلى معلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$   
لتكن  $A(x_A, y_A)$  نقطة من المستوى  $\mathcal{P}$  و  $\vec{v}(\alpha, \beta)$  متجهة غير منعدمة.  
النظمة  $\begin{cases} x = x_A + k\alpha \\ y = y_A + k\beta \end{cases} / k \in \mathbb{R}$  تسمى تمثيلا بارامتريا للمستقيم المار من  $A(x_A, y_A)$  و الموجه بالمتجهة  $\vec{v}(\alpha, \beta)$

### معادلة ديكارتية لمستقيم

كل مستقيم في المستوى له معادلة ديكارتية على الشكل :  $ax + by + c = 0$  حيث  $(a, b) \neq (0, 0)$  و  $\vec{v}(-b, a)$  متجهة موجهة له

### معادلة مختزلة لمستقيم

يكون مستقيم  $(D)$  غير مواز لمحور الأرتاب إذا فقط إذا كانت له معادلة ديكارتية على شكل :  $y = mx + p$  و تسمى معادلة مختزلة للمستقيم  $(D)$  . العدد  $m$  يسمى المعامل الموجه للمستقيم  $(D)$

### الأوضاع النسبية لمستقيمين

توازي مستقيمين معرفين بمعادلتين ديكارتيتين

• يكون مستقيمان معادلتهما على التوالي :  $ax + by + c = 0$  و  $a'x + b'y + c' = 0$  متوازيين إذا و فقط إذا كان :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0$$

• يكون مستقيمان متوازيين إذا فقط إذا كانت متجهتهما الموجهتان مستقيمتين

توازي مستقيمين معرفين بمعادلتيهما المختزلتين

• يكون مستقيمان معادلتهما على التوالي :  $y = mx + p$  و  $y = m'x + p'$  متوازيين إذا فقط إذا كان :  $m = m'$

### تقاطع مستقيمين

• يكون المستقيمان  $(D)$  و  $(D')$  اللذان معادلتهما على التوالي  $ax + by + c = 0$  و  $a'x + b'y + c' = 0$

متقاطعين إذا فقط إذا كان  $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$  و زوج إحداثيتي نقطة تقاطع  $(D)$  و  $(D')$  هو حل للنظمة :

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

• يكون المستقيمان  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$  اللذان معادلتهما على التوالي  $y = mx + p$  و  $y = m'x + p'$  متقاطعين إذا فقط

إذا كان  $m \neq m'$  و زوج إحداثيتي نقطة تقاطع  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$  هو حل للنظمة :  $\begin{cases} y = mx + p \\ y = m'x + p' \end{cases}$