

<i>Direction provinciale : Khemisset</i>	<i>Examen corrigé du mathématiques</i>	<i>Niveau :3APIC // Session : 2018/2019</i>
<i>Lycée Collégiale Mohammed ELQOURI</i>	<i>Région : Rabat -Salé-Kenitra</i>	<i>Professeur : LAHSAINI Yassin</i>

Examen

Exercice 1:.....(5.5 pts)

1- Résous les deux équations suivantes:

a) $x - 3 = 5 - x$0.5pt

b) $5x(x - 3) + (2x + 1)(x - 3) = 0$1pt

2- Résous les deux inéquations suivantes:

a) $5x + 1 < 2x - 5$1pt

b) $\frac{x-4}{3} < \frac{x-2}{2}$ 1pt

3- a) Résous le système suivant : $\begin{cases} x + y = 186 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$ 1pt

b) Une bibliothèque comprend 186 livres, un certain nombre d'entre eux sont en arabe et les autres en français. Si vous savez que le nombre de livres en arabe est égal au double du nombre de livres en français. Calcule le nombre de livres de chaque langue.1pt

Exercice 2:.....(5.5 pts)

Le plan est rapporté d' un repère orthonormé (O, I, J) .

On considère la fonction affine f définie par : $f(x) = 2x - 4$ et soit (D_1) est sa représentation graphique dans le repère (O, I, J) .

1- a) Calcule $f(0)$ et $f(1)$0.5pt

b) Détermine le nombre a qui a pour image 2 par f 0.5pt

c) Le point $H(1; 2)$ appartient – il à (D_1) ? justifie ta réponse0.5pt

d) Détermine l'abscisse du point d'intersection de (D_1) et l'axe des abscisses1pt

2- Soient g la fonction linéaire telle que sa représentation graphique (D_2) passe par le point $P(-1; 2)$.

a) Montre que : $g(x) = -2x$ 1pt

b) Détermine l'abscisse du point d'intersection de (D_1) et (D_2) 1pt

c) Construis (D_1) et (D_2) dans un même repère (O, I, J)1pt

Exercice 3:.....(6pts)

Dans un plan rapporté à un repère orthonormé , on considère les points : $A(0; -4); B(3; 0); C(4; 4); E(2; 0)$ et la

droite (Δ) d'équation : $y = \frac{-1}{2}x + 1$.

1- Détermine les coordonnées du vecteur \overrightarrow{AC} et calcule la distance AC1pt

2- Montre que le point E est le milieu du segment $[AC]$ 1pt

3- Vérifie que l'équation réduite de la droite (AC) est : $y = 2x - 4$ 1pt

4- a) Montre que la droite (Δ) passe par le point E 1pt

b) Montre que la droite (Δ) est la médiatrice du segment $[AC]$ 1pt

5- Détermine l'équation réduite de la droite (L) qui passe par B et qui est parallèle à la droite (AC) 1pt

Exercice 4:.....(3pts)

Soit ABC un triangle rectangle en B tel que $BC=2AB$, et soit I le milieu de $[BC]$.

On considère la translation T qui transforme B en I , et soit le point K l'image du point A par la translation T .

1- Constuis une figure qui vérifie les données0.5pt

2- Quelle est l'image du point I par la translation T ? justifie ta réponse0.5pt

- 3- Détermine l'image de la droite (BC) par la translation T ? justifie ta réponse0.5pt
- 4- Montre que le quadrilatère $AKIB$ est un carré1pt
- 5- Détermine la mesure de l'angle \widehat{IKC} .Justifie ta réponse0.5pt

Correction de l'examen

Exercice 1:

1- Résolution des équations :

a) $x - 3 = 5 - x$

$$x - 3 + 3 = 5 - x + 3$$

$$x = 8 - x$$

$$x + x = 8 - x + x$$

$$2x = 8$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$$

$$x = 4$$

La solution de cette équation est 4.

b) $5x(x - 3) + (2x + 1)(x - 3) = 0$

$$(x - 3)(5x + 2x + 1) = 0$$

$$(x - 3)(7x + 1) = 0$$

$$x - 3 = 0 \text{ ou } 7x + 1 = 0$$

$$x - 3 + 3 = 0 + 3 \text{ ou } 7x + 1 - 1 = 0 - 1$$

$$x = 3 \text{ ou } 7x = -1$$

$$x = 3 \text{ ou } \frac{7x}{7} = \frac{-1}{7}$$

$$x = 3 \text{ ou } x = \frac{-1}{7}$$

Les solutions de cette équation sont : 3 et $\frac{-1}{7}$

2- Résolution des inéquations

a) $5x + 1 < 2x - 5$

$$5x + 1 - 1 < 2x - 5 - 1$$

$$5x < 2x - 6$$

$$5x - 2x < 2x - 6 - 2x$$

$$3x < -6. \text{ Puisque } 3 > 0 \text{ alors :}$$

$$\frac{3x}{3} < \frac{-6}{3}$$

$$x < \frac{-6}{3}$$

Les solutions de cette inéquation sont tous les

nombre réels qui sont strictement inférieurs à $\frac{-6}{3}$

b) $\frac{x-4}{3} < \frac{x-2}{2}$

$$\frac{2(x-4)}{2 \times 3} < \frac{3(x-2)}{3 \times 2}$$

Puisque $6 > 0$ alors :

$$2(x - 4) < 3(x - 2)$$

$$2x - 8 < 3x - 6$$

$$2x - 3x < -6 + 8$$

$$-x < 2. \text{ puisque } -1 < 0 \text{ alors :}$$

$$\frac{-x}{-1} > \frac{2}{-1}$$

$$x > -2$$

Les solutions de cette inéquation sont tous les

nombre réels qui sont strictement supérieurs à -2

3- Résolution de système

a)
$$\begin{cases} x + y = 186 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

D'après la deuxième équation on a : $x = 2y$. Je remplace x par $2y$ dans la première équation je trouve :

$$2y + y = 186 \text{ alors } 3y = 186 \text{ par suite } y = \frac{186}{3}, \text{ d'où } y = 62.$$

$$\text{On a } x = 2y = 2 \times 62 = 124 \text{ d'où } x = 124.$$

Le couple $(12, 62)$ est la solution unique de ce système.

b) Résolution du problème :

❖ Choix des inconnues :

x : le nombre de livres en arabe

y : le nombre de livres en français

❖ Mise en système

Le total de livres est égale 186 signifie que $x + y = 186$

Le nombre de livres en arabe est égal au double de nombre de livres en français signifie que $x = 2y$ alors $x - 2y = 0$

$$\begin{cases} x + y = 186 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Enfin je trouve le système $x - 2y = 0$

❖ Résolution du système:

D'après la question (3.a) on a $x = 124$ et $y = 62$

❖ La vérification :

$$x + y = 124 + 62 = 186 \text{ et } 2 \times 62 = 124$$

❖ La conclusion :

Le nombre de livres en arabe est 124 et le nombre de livres en français est 62.

Exercice 2:

1- $f(x) = 2x - 4$

a) $f(0) = 2 \times 0 - 4 = 0 - 4 = -4$ et $f(1) = 2 \times 1 - 4 = 2 - 4 = -2$ alors $f(0) = -4$ et $f(1) = -2$

b) Le nombre a , a pour image 2 par f signifie que $f(a) = 2$ alors $2a - 4 = 2$ par suite $2a = 6$ d'où $a = \frac{6}{2} = 3$
le nombre a , qui a pour image 2 par f est $a = 3$.

c) Le point $H(1; 2)$ appartient-il à (D_1) ?

Comme $f(1) = -2 \neq 2$ alors le point H n'appartient pas au (D_1) .

d) Détermine l'abscisse du point d'intersection de (D_1) et l'axe des abscisses

On note $K(x_K, y_K)$ le point d'intersection de (D_1) et l'axe des abscisses alors $y_K = 0$.

$K \in (D_1)$ alors $f(x_K) = y_K$ par suite $2x_K - 4 = 0$ donc $x_K = \frac{4}{2} = 2$.

l'abscisse du point d'intersection de (D_1) et l'axe des abscisses est 2.

2- (D_2) passe par le point $P(-1; 2)$

a) g est une fonction linéaire alors $g(x) = ax$. Puisque (D_2) passe par le point $P(-1; 2)$ alors $g(-1) = 2$ d'où

$$a = \frac{g(-1)}{-1} = \frac{2}{-1} = -2 \text{ donc } g(x) = -2x.$$

b) Détermine l'abscisse du point d'intersection de (D_1) et (D_2)

Soit $L(x_L; y_L)$ le point d'intersection de (D_1) et (D_2) alors $f(x_L) = g(x_L)$ donc $2x_L - 4 = -2x_L$ par suite $2x_L + 2x_L = 4$ alors $4x_L = 4$ d'où $x_L = 1$.

Exercice 3

1- $A(0; -4)$ et $C(4; 4)$

$$\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) \text{ alors } \overrightarrow{AC}(4 - 0; 4 - (-4)) \text{ d'où } \overrightarrow{AC}(4; 8)$$

On a $\overrightarrow{AC}(4; 8)$ alors $AC = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{16 + 64} = \sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{16} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$ d'où $AC = 4\sqrt{5}$.

2- Soit $M(x_M; y_M)$ le milieu du segment $[AC]$ alors:

$$x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{0 + 4}{2} = \frac{4}{2} = 2 = x_E \text{ et } y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{-4 + 4}{2} = \frac{0}{2} = 0 = y_E$$

Les point M et E ont même coordonnées alors E est le milieu de $[AC]$.

3- L'équation réduite de la droite (AC) s'écrit sous la forme : $y = mx + b$

$$m = \frac{y_A - y_C}{x_A - x_C} = \frac{8}{4} = 2 \text{ alors } y = 2x + p. \text{ Or } A(0; -4) \in (AC) \text{ alors } y_A = 2x_A + p \text{ par suite } -4 = 2 \times 0 + p \text{ d'où } p = -4$$

L'équation réduite de la droite (AC) est : $y = 2x - 4$.

4- a) on a $(\Delta): y = \frac{-1}{2}x + 1$ et $E(2, 0)$ alors : Si $x = x_E = 2$ alors $y = \frac{-1}{2} \times 2 + 1 = -1 + 1 = 0 = y_E$

d'où le point E appartient à la droite (Δ) par suite la droite (Δ) passe par le point E .


b) on a : $(AC) : y = 2x - 4$ et $(\Delta): y = \frac{-1}{2}x + 1$. comme $2 \times \frac{-1}{2} = -1$ alors $(\Delta) \perp (AC)$.

Puisque (Δ) est perpendiculaire à $[AC]$ en son milieu alors (Δ) est la médiatrice de $[AC]$.

5- L'équation réduite de la droite (L) s'écrit sous la forme : $y = ax + b$.

Puisque (L) parallèle à (AC) donc $a = 2$ alors $y = 2x + b$. Or $B(3; 0) \in (L)$ alors $y_B = 2x_B + b$ par suite $0 = 2 \times 3 + b$
 $0 = 6 + b$ donc $b = -6$. d'où l'équation réduite de la droite (L) est : $y = 2x - 6$.

6- La représentation de (D_1) et (D_2) dans un même repère (O, I, J)



Exercice 4

- 1- voir la figure ci – dessous .
- 2- Puisque I est le milieu de $[BC]$ alors $\vec{BI} = \vec{IC}$ d'où le point C est l'image du point I par la translation T .
- 3- On a I et C sont respectives les images des points B et C alors l'image de (BI) est (IC) et puisque les deux droites (BC) et (BI) sont confondues alors ils ont même images d'où l'image de (BC) est (BC) .
- 4- Puisque K est l'image de A par la translation T alors le quadrilatère $AKIB$ est un parallélogramme.
 $BI = \frac{BC}{2} = \frac{2AB}{2} = AB$ et $\widehat{ABK} = 90^\circ$ alors le quadrilatère $AKIB$ est un carré.
- 5- ABI est un triangle rectangle isocèle en B alors $\widehat{BAI} = 45^\circ$, et puisque les points I, K et C sont respectives les images des points B, A et I alors l'image de l'angle \widehat{BAI} est l'angle \widehat{IKC} d'où $\widehat{IKC} = \widehat{BAI} = 45^\circ$.

